

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЕКСИПАЛ М ГІДРОЛОСЬЙОН

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 мл емульсії на шкірної містить 20 мг сечовини;

допоміжні речовини: кислота лимонна, моногідрат Е (330); натрію цитрат; динатрію едетат; Cosmocil CQ (20% водний розчин полігексаніду) ; ПЕГ-6 стеарат; макроголу стеарат; олія мінеральна легка; диметикон 350; ароматизатор Mirage Y; вода очищена.

Лікарська форма. Емульсія на шкірної.

Рідка гомогенна емульсія білого кольору з характерним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

Шпіріг Фарма АГ/ Spirig Pharma AG.

Фрошackerштрассе 6, 4622 Egerkingen, Швейцарія/ Froschackerstrasse 6, 4622 Egerkingen, Switzerland.

Фармакотерапевтична група. Препарат і з пом'якшувальною та захисною дією.

Код АТС D02A E01.

Сечовина є натуральним зволожуючим фактором зроговілого шару епідермісу.

Вона впливає на зв'язування води внутрішньоклітинних білків. Вона не розчиняє кератин, але пом'якшує його. Концентрація сечовини у препараті не спричиняє подразнення шкіри та підвищує бар'єрну функцію епідермісу. Допоміжні речовини формують емульсію типу олія у воді, що містить 11% ліпідів.

Показання для застосування.

Лікування та захист подразненої або чутливої шкіри нормального та помірно сухого типу; як додаткове місцеве лікування захворювань шкіри, а також для догляду за шкірою у періоди ремісії.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату .

Особливі застереження.

Для нашірнього застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Дозволяється застосовувати лікарський засіб під час вагітності та годування груддю. Не наносити препарат на ділянку молочних залоз жінкам у період лактації.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Особливостей застосування дітям немає. Дозволяється застосування дітям віком від 4 тижнів, а з перших днів життя - тільки після консультації з лікарем.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим та дітям застосовують 2 - 3 рази на добу. Препарат наносять на уражені ділянки шкіри. Звичайна тривалість лікування - не більше 6 тижнів. Якщо протягом декількох днів з початку лікування не настає покращення або симптоми погіршуються, проконсультуйтеся з лікарем щодо подальшого застосування препарату.

Передозування.

Невідомі.

Побічні ефекти.

Зрідка виникають симптоми підвищеної чутливості, почервоніння, печіння, свербіж.

У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 200 мл, 500 мл у флаконі. По 1 флакону в картонній коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта