

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**ОЛІКЛІНОМЕЛЬ N7-1000E**  
**(OLICLINOMEL N7-1000E)**

**Склад:**

*діючі речовини:* суміш олій рафінованих оливкової та соєвої; L-аланін; L-аргінін; гліцин; L-гістидин; L-ізолейцин; L-лейцин; L-лізин (у вигляді L-лізину гідрохлориду); L-метіонін; L-фенілаланін; L-пролін; L-серин; L-треонін; L-триптофан; L-тирозин; L-валін; натрію ацетату тригідрат; натрію гліцерофосфату пентагідрат; калію хлорид; магнію хлориду гексагідрат; глюкоза безводна (у вигляді глюкози моногідрату); кальцію хлориду дигідрат;  
1 пакет об'ємом 1000 мл містить:

| Діючі речовини                                      | Ліпідна<br>емульсія<br>(200 мл) | Розчин<br>амінокислот<br>(400 мл) | Розчин<br>глюкози<br>(400 мл) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Суміш олій рафінованих оливкової та соєвої *        | 40 г                            |                                   |                               |
| L-аланін                                            |                                 | 8,28 г                            |                               |
| L-аргінін                                           |                                 | 4,60 г                            |                               |
| Гліцин                                              |                                 | 4,12 г                            |                               |
| L-гістидин                                          |                                 | 1,92 г                            |                               |
| L-ізолейцин                                         |                                 | 2,40 г                            |                               |
| L-лейцин                                            |                                 | 2,92 г                            |                               |
| L-лізин<br>(у вигляді L-лізину гідрохлориду)        |                                 | 2,32 г<br>(2,90 г)                |                               |
| L-метіонін                                          |                                 | 1,60 г                            |                               |
| L-фенілаланін                                       |                                 | 2,24 г                            |                               |
| L-пролін                                            |                                 | 2,72 г                            |                               |
| L-серин                                             |                                 | 2,00 г                            |                               |
| L-треонін                                           |                                 | 1,68 г                            |                               |
| L-триптофан                                         |                                 | 0,72 г                            |                               |
| L-тирозин                                           |                                 | 0,16 г                            |                               |
| L-валін                                             |                                 | 2,32 г                            |                               |
| Натрію ацетату тригідрат                            |                                 | 2,45 г                            |                               |
| Натрію гліцерофосфату пентагідрат                   |                                 | 2,14 г                            |                               |
| Калію хлорид                                        |                                 | 1,79 г                            |                               |
| Магнію хлориду гексагідрат                          |                                 | 0,45 г                            |                               |
| Глюкоза безводна<br>(у вигляді глюкози моногідрату) |                                 |                                   | 160 г<br>(176 г)              |
| Кальцію хлориду дигідрат                            |                                 |                                   | 0,30 г                        |

\* Суміш олій рафінованих оливкової (приблизно 80 %) та соєвої (приблизно 20 %);

1 пакет об'ємом 1500 мл містить:

|                                 |
|---------------------------------|
| Діючі речовини                  |
| Ліпідна<br>емульсія<br>(300 мл) |

Розчин  
амінокислот  
(600 мл)

Розчин  
глюкози  
(600 мл)

Суміш олій рафінованих оливкової та соєвої  
\*

60 г

|          |  |
|----------|--|
| L-аланін |  |
|          |  |
| 12,42 г  |  |
|          |  |


6,90 г



Гліцин



6,18 г




|            |  |
|------------|--|
| L-гістидин |  |
| 2,88 г     |  |

|             |  |
|-------------|--|
| L-ізолейцин |  |
| 3,60 г      |  |

|          |  |
|----------|--|
| L-лейцин |  |
| 4,38 г   |  |

L-лізин  
(у вигляді L-лізину гідрохлориду)

3,48 г  
(4,35 г)



L-метіонін

2,40 г

