

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СТРЕПСІЛ® без цукру, зі смаком лимона

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 ледяник містить 2,4-дихлорбензилового спирту 1,2 мг, амільметакрезолу 0,6 мг;

допоміжні речовини: ароматизатор лимона, винна кислота, сахарин натрію, мальтит рідкий, ізомальт.

Лікарська форма. Ледяники.

Круглі ледяники від білого до блідо-жовтого кольору, із зображенням знака «S» з обох боків ледяника.

Назва і місцезнаходження виробника.

Реккіт Бенкізер Хелскер Інтернешл Лімітед, Тейн Роуд, Ноттінгем, Ноттінгемшир, NG90 2DB, Велика Британія.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла . Антисептики. Код АТС R02A A20.

Препарат має антисептичні властивості. Активний щодо широкого спектра грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів *in vitro*; чинить протигрибкову дію. Ефективність препарату зумовлена наявністю двох антибактеріальних компонентів широкого спектра дії, що полегшують біль у горлі та зменшують прояви запалення. Амільметакрезол руйнує структуру білків бактерій, що проявляється бактерицидною дією. 2,4-дихлорбензил-алкоголь виявляє бактериостатичну дію за рахунок зневоднення бактеріальної клітини.

У зв'язку з незначною абсорбцією препарату у кров СТРЕПСІЛ® належить до засобів місцевого застосування. Враховуючи це, фармакокінетичні показники не визначалися.

Показання для застосування.

Як антисептичний препарат для полегшення болю у горлі.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату. Препарат не слід застосовувати пацієнтам з непереносимістю фруктози, синдромі мальабсорбції глюкози-галактози, сахарози-ізомальтози.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не перевищувати рекомендовані дози.

Якщо симптоми тривають протягом 3 днів, супроводжуються високою температурою, головним болем та іншими явищами, необхідно звернутися до лікаря для додаткового коригування схеми лікування.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Безпека при застосуванні препарату у період вагітності або годування груддю не встановлювалася, але не очікується виникнення ризику у ці періоди. Незважаючи на це, усі лікарські засоби, що призначаються у період вагітності або годування груддю, слід застосовувати з обережністю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.

Діти. Враховуючи лікарську форму, не рекомендується застосовувати дітям віком до 6 років.

Спосіб застосування та дози.

Рекомендується дорослим і дітям віком старше 6 років. Приймати по 1 ледянику кожні 2 -3 години. Ледяник необхідно розсмоктувати до повного розчинення. Не застосовувати більше 8 ледяників протягом 24 годин. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально залежно від перебігу клінічної картини.

Не потрібно коригувати дозу пацієнтам літнього віку.

Передозування.

Передозування малоімовірне. Передозування може проявлятися лише симптомами дискомфорту з боку травного тракту. У такому випадку проводять симптоматичне лікування.

Побічні ефекти.

Рідко можуть виникати реакції гіперчутливості, свербіж, висипання на шкірі, кропив'янка, еритема, стоматит, відчуття печіння, пощипування чи болю у роті, набряк та біль губ, язика чи горла, глосит, глосидинія. Дуже рідко – диспепсія та нудота. Ізомальт і мальтит рідкий, що входять до складу препарату, можуть викликати слабкий проносний ефект (після застосування кількох ледяників на добу).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Клінічно значуща взаємодія невідома.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Зберігати у сухому місці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка.

По 8 або 12 ледяників у блістері. По 1 або 2 блістери у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.