

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГЛІЦЕРИН

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: гліцерин;

1 супозиторій містить гліцерину 1,24 або 2,11 г;

допоміжні речовини: макрогол 400; кислота стеаринова; натрію карбонат; декагидрат.

Лікарська форма. Супозиторії.

Супозиторії прозорі або напівпрозорі, майже без кольору або з жовтувато-коричневатим відтінком кольору з мажучою поверхнею, гігроскопічні, торпедоподібної форми. Допускається помутніння супозиторіїв, незначне розм'якшення поверхневого шару та підпотівання білестера. Допускається наявність повітряного шару.

Назва і місце знаходження виробника: ВАТ "НИЖФАРМ". Російська Федерація, 603950, м. Нижній Новгород, ГСП-459, вул. Салганська, 7.

Фармакотерапевтична група: Послаблюючі засоби. Код АТС А06А Х01.

Послаблюючий засіб, пом'якшує затверділі фекальні маси, полегшує їх проходження по товстій кишці, подразнює слизову оболонку кишечника, рефлекторно стимулює моторику кишечника.

Показання для застосування.

Запори різної етіології (коли застосування пероральних препаратів неможливе).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Кишкова непрохідність, ниркова недостатність, апендицит, кровотечі, діарея, геморой у стадії загострення, тріщини заднього проходу, запальні захворювання, пухлини прямої кишки, недиагностований біль у животі.

Особливі застереження. Систематичне застосування не рекомендується. Лікування припиняють після відновлення нормальної перистальтики кишечника. Застосовувати з обережністю при нирковій недостатності. Не змащувати супозиторії мінеральними рідкими або твердими маслами.

Застосування у період вагітності або годування груддю . Застосовують у період вагітності після консультації лікаря. Застосовують у період годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Застосовують дітям віком від 2 років.

Спосіб застосування та дози Застосовують ректально 1 раз на добу, вранці, через 15-20 хвилин після їди.

Дорослим та дітям старше 6 років: 1 супозиторій по 2,11 г або 2 супозиторія по 1,24 г.

Дітям віком від 2 до 6 років: 1 супозиторій по 1,24 г.

Передозування. Випадки передозування при ректальному застосуванні не відомі.

Побічні ефекти. Можливе виникнення алергічних реакцій у місці введення супозиторія (свербіж, печіння). При тривалому застосуванні можливе послаблення фізіологічного процесу дефекації.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії Не відома.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. По 5 супозиторіїв у білестері. По 2 білестери у картонній пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.