

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

МЕЛІСИ ТРАВА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: melissae herba;

1 пачка містить трави меліси 50 г; 1 фільтр-пакет містить трави меліси 1,5 г.

Лікарська форма. Трава.

Подрібнена сировина. Шматочки стебел, листя зі шматочками квіток, окремими квітками або без них, які проходять крізь сито з отворами розміром 5,6 мм. Колір стебел зелений, листя – від світло- або сіро-зеленого до темно-зеленого, вінчика – жовтуватий, білий або блідо-ліловий. Запах приємний, лимонний. Смак гіркувато-пряний.

Порошок крупний. Суміш шматочків стебел, листя та квіток від світло- або сіро-зеленого до зеленого кольору з жовтуватими, білими або блідо-ліловими вкрапленнями, які проходять крізь сито з отворами розміром 1,4 мм. Запах приємний, лимонний. Смак гіркувато-пряний.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Снодійний та седативний засіб Код АТС N05C M.

Показання для застосування. Стани загального нервового збудження (підвищена емоційна активність, збудливість, дратівливість), безсоння, вегетосудинна дистонія, зміни артеріального тиску внаслідок стресу.

Протипоказання. Гіперчутливість до препарату, артеріальна гіпотензія.

Особливі застереження. Перед початком лікування порадьтеся з лікарем.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітним і жінкам, які годують груддю, застосування можливе після консультації з лікарем.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

З обережністю застосовувати особам, які керують транспортом та механічними засобами.

Діти.

Дітям віком до 3 років не застосовують.

Спосіб застосування та дози. 1 столову ложку трави вміщують в емальований посуд, заливають 200 мл гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і настоюють на киплячій водяній бані 15 хв. Охолоджують при кімнатній температурі 45 хв, проціджують, залишок віджимають до процідженого настою. Об'єм настою доводять кип'яченою водою до 200 мл. Дорослі приймають у теплому вигляді по 1/3 склянки 3 рази на день за 15 - 20 хв до їди. Діти 3 - 5 років – по 1 чайній ложці, 5 - 7 років – по 1 десертній ложці, 7 - 12 років – по 1 столовій ложці, 12 - 14 років – по 2 столові ложки, старше 14 років – по 1/4 склянки 3 рази на день за 15 - 20 хв до їди. Перед вживанням настій рекомендується збовтувати. 2 фільтр-пакети вміщують у скляний або емальований посуд, заливають 200 мл окропу, закривають і настоюють 15 хв. Дорослі приймають у теплому вигляді по 1/2 склянки 3 - 4 рази на день за 15 - 20 хв до їди. Діти 3 - 5 років – по 1 десертній ложці, 5 - 7 років – по 1 столовій ложці, 7 - 12 років – по 2 столові ложки, 12 - 14 років – по 1/4 склянки, старше 14 років – по 1/3 склянки 3 рази на день за 15 - 20 хв до їди.
Тривалість лікування визначає лікар.

Передозування. При передозуванні можливі запаморочення, в'ялість, зниження концентрації уваги.

Лікування. Припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції (гіперемія, висипи, свербіж та набряк шкіри). При появі побічних реакцій припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. При одночасному застосуванні можливе посилення дії інших седативних та снодійних засобів.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій – у прохолодному (8-15°C) місці не більше 2 діб.

Упаковка. По 50 г у пачці з внутрішнім пакетом по 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.