

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**БОРНА КИСЛОТА**  
**(BORIC ACID)**

**Склад:**

*діюча речовина:* борна кислота;  
100 мл розчину містять борної кислоти –3 г;  
*допоміжні речовини:* етанол 96 %, вода очищена.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 3 %.  
*Основні фізико-хімічні властивості.* прозора безбарвна рідина.

**Фармакотерапевтична група.** Антисептичні та дезінфекційні засоби Код АТХD08A D.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Препарат чинить антисептичну дію. Коагулює білки (в тому числі ферменти) мікробної клітини, порушує проникність клітинної оболонки, завдяки чому затримується ріст і розвиток бактерій.

*Фармакокінетика.*

При зовнішньому застосуванні препарат абсорбується через ушкоджену шкіру, ранову поверхню; при випадковому застосуванні внутрішньо – через слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. Кислота борна може накопичуватися у тканинах організму. Виводиться з організму повільно.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Піодермія, мокнуча екзема, попрілості, гострий та хронічний середній отит.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до кислоти борної, порушення функції нирок, хронічний мезотимпаніт з нормальною або мало зміненою слизовою оболонкою, травматичні перфорації барабанної перетинки.

**Особливі заходи безпеки.**

Не застосовувати препарат на великі ділянки шкіри, не застосовувати для промивання порожнин. Не допускати потрапляння препарату в очі.

*Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.*

*Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.*

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Взаємодія поки що невідома.

*При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.*

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Препарат протипоказаний жінкам у період вагітності або годування груддю.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.**

Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

Застосовувати зовнішньо. При піодермії, попрілостях, екземі уражені ділянки шкіри обробляти за допомогою серветки, попередньо змоченої препаратом, 2-3 рази на добу.

При отиті у зовнішній слуховий прохід вводити змочені розчином турунди або закапувати по 3-5 крапель 2-3 рази на добу.

### ***Діти.***

Дітям препарат не застосовувати.

### ***Передозування.***

У разі випадкового застосування препарату внутрішньо провести зондове промивання шлунка, призначити внутрішньо сольові проносні засоби, ентеросорбенти (активоване вугілля), симптоматичну терапію.

Симптоми гострого отруєння: нудота, блювання, діарея, порушення кровообігу та пригнічення центральної нервової системи, зниження температури тіла, шок, кома, еритематозне висипання. У разі тяжкого отруєння вживати заходів щодо підтримання життєво важливих функцій організму, проводити гемодіаліз або перитонеальний діаліз, замінне переливання крові. При тривалому застосуванні препарату на великих за площею ділянках шкіри можуть виникати симптоми хронічної інтоксикації: набряк тканин, виснаження, стоматит, екзема, порушення менструального циклу у жінок, анемія, судоми, алопеція. У цих випадках препарат слід відмінити, проводити симптоматичне лікування.

### ***Побічні реакції.***

Застосування препарату може спричинити алергічні реакції (почервоніння шкіри, свербіж, кропив'янка, висипання, набряк). У поодиноких випадках – розвиток анафілактичної реакції, включаючи шок; десквамація епітелію.

При тривалому застосуванні та у пацієнтів з порушенням функції нирок можуть виникати нудота, блювання, діарея, головний біль, сплутаність свідомості, олігурія, судоми.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!*

***Термін придатності.*** 3 роки.

### ***Умови зберігання.***

Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

***Упаковка.*** По 10 мл або по 20 мл у флаконах.

***Категорія відпуску.*** Без рецепта.

### ***Виробник.***

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

***Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.***

Україна, 10014, м. Житомир, вул. Лермонтовська, 5.

## **ІНСТРУКЦІЯ**

**для медичного застосування лікарського засобу**

### **БОРНА КИСЛОТА (BORIC ACID)**

### ***Склад:***

*діюча речовина:* борна кислота;

100 мл розчину містять борної кислоти –3 г;

*допоміжні речовини:* етанол 96 %, вода очищена.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 3 %.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора безбарвна рідина.

**Фармакотерапевтична група.** Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТХ D08A D.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Препарат чинить антисептичну дію. Коагулює білки (в тому числі ферменти) мікробної клітини, порушує проникність клітинної оболонки, завдяки чому затримується ріст і розвиток бактерій.

*Фармакокінетика.*

При зовнішньому застосуванні препарат абсорбується через ушкоджену шкіру, ранову поверхню; при випадковому застосуванні внутрішньо – через слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. Кислота борна може накопичуватися у тканинах організму. Виводиться з організму повільно.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Піодермія, мокнуча екзема, попрілості, гострий та хронічний середній отит.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до кислоти борної, порушення функції нирок, хронічний мезотимпаніт з нормальною або мало зміненою слизовою оболонкою, травматичні перфорації барабанної перетинки.

**Особливі заходи безпеки.**

Не застосовувати препарат на великі ділянки шкіри, не застосовувати для промивання порожнин. Не допускати потрапляння препарату в очі.

*Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.*

*Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.*

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Взаємодія поки що невідома.

*При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.*

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Препарат протипоказаний жінкам у період вагітності або годування груддю.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.**

Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

Застосовувати зовнішньо. При піодермії, попрілостях, екземі уражені ділянки шкіри обробляти за допомогою серветки, попередньо змоченої препаратом, 2-3 рази на добу.

При отиті у зовнішній слуховий прохід вводити змочені розчином турунди або закапувати по 3-5 крапель 2-3 рази на добу.

**Діти.**

Дітям препарат не застосовувати.

**Передозування.**

У разі випадкового застосування препарату внутрішньо провести зондове промивання шлунка, призначити внутрішньо сольові проносні засоби, ентеросорбенти (активоване вугілля), симптоматичну терапію.

Симптоми гострого отруєння: нудота, блювання, діарея, порушення кровообігу та пригнічення центральної нервової системи, зниження температури тіла, шок, кома, еритематозне висипання. У разі тяжкого

отруєння вживати заходів щодо підтримання життєво важливих функцій організму, проводити гемодіаліз або перитонеальний діаліз, замінне переливання крові. При тривалому застосуванні препарату на великих за площею ділянках шкіри можуть виникати симптоми хронічної інтоксикації: набряк тканин, виснаження, стоматит, екзема, порушення менструального циклу у жінок, анемія, судоми, алопеція. У цих випадках препарат слід відмінити, проводити симптоматичне лікування.

***Побічні реакції.***

Застосування препарату може спричинити алергічні реакції (почервоніння шкіри, свербіж, кропив'янка, висипання, набряк). У поодиноких випадках – розвиток анафілактичної реакції, включаючи шок; десквамація епітелію.

При тривалому застосуванні та у пацієнтів з порушенням функції нирок можуть виникати нудота, блювання, діарея, головний біль, сплутаність свідомості, олігурія, судоми.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!*

***Термін придатності.*** 3 роки.

***Умови зберігання.***

Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

***Упаковка.*** По 10 мл або по 20 мл у флаконах.

***Категорія відпуску.*** Без рецепта.

***Виробник.***

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

***Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.***

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.