

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

### МЕТЕОСПАЗМІЛ

#### Склад лікарського засобу:

*діючі речовини:* 1 капсула містить альверину цитрату 60 мг; симетикону 300 мг;  
*допоміжні речовини:* желатин, гліцерин, титану діоксид (Е 171).

#### Лікарська форма. Капсули.

Непрозорі м'які продовгуваті капсули блідо-жовтого кольору, розміру № 6.  
Вміст капсули: густа білувата суспензія.

#### Назва і місцезнаходження виробника.

*Виробництво нерозфасованої продукції:*

ЛЖВ КАПСЮЛЬ.

20 рю Луї-Шарль Вернін 77190 ДАММАРІ-ЛЕ-ЛІС, Франція.

*Виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, контроль якості, відповідальний за випуск серії:*

Лабораторії Майолі Спіндлер.

6, Авеню де л'Европ 78400 Шату Франція.

#### Фармакотерапевтична група. Препарати для лікування функціональних розладів шлунково-кишкового тракту. Альверин, комбінатії.

Код АТС А03А Х58.

Альверин – міотропний спазмолітик, дія якого не супроводжується атропіноподібним ефектом. Знижує підвищений тонус гладкої мускулатури кишечника. Альверин діє на мускулатуру шлунково-кишкового тракту на клітинному рівні, блокуючи кальцієві канали в гладких м'язових клітинах кишечника, а також блокує нейрорецептори рецептор-залежних каналів, і таким чином знімає м'язовий спазм.

Симетикон – гідрофобна полімерна сполука з низьким поверхневим натягом, знижує газоутворення у кишечнику та покриває захисною плівкою стінки шлунково-кишкового тракту.

#### Показання для застосування.

Симптоматичне лікування функціональних розладів кишечника, особливо тих, що проявляються метеоризмом.

#### Протипоказання.

Підвищена чутливість до альверину або будь-якого іншого компонента препарату.

Кишкова непрохідність, в тому числі паралітична; обструктивні захворювання шлунково-кишкового тракту.

#### Особливі застереження.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Застосування препарату у період вагітності або годування груддю не рекомендовано.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Препарат може спричинити запаморочення, що слід враховувати при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

*Діти.* Препарат не застосовувати у педіатричній практиці.

#### Спосіб застосування та дози.

Застосовувати внутрішньо дорослим по 1 капсулі 2-3 рази на добу.

Приймати перед їдою.

Курс лікування визначає лікар індивідуально.

**Передозування.** Випадків передозування не відмічено.

#### Побічні ефекти.

*З боку нервової системи:* головний біль, запаморочення.

*З боку імунної системи:* анафілактоїдні реакції включаючи кропив'янку, набряк гортані, задишку, чхання, шкірні висипання, свербіж, анафілактичний шок.

*З боку печінки та жовчовивідних шляхів:* жовтяниця внаслідок гепатиту, порушення функції печінки, які відновлюються після припинення лікування.

*З боку шлунково-кишкового тракту:* нудота.

#### Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не виявлена.

**Термін придатності.** 3 роки.

#### Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

#### Упаковка.

По 10 капсул у блістері, по 2 або 3 блістери у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.