

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ПІВОНІЇ НАСТОЙКА
(PAEONIAE TINCTURA)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 флакон містить настойки півонії незвичайної трави, кореневищ із коренями *Paeonia anomala herba, rhizoma cum radicibus*) (1:10) (екстрагент – етанол 40 %) - 50 мл або 100 мл.

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина світло-коричневого кольору зі специфічним запахом; допускається утворення осаду при зберіганні.

Назва і адрес виробника.

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».
Україна, 10014, м. Житомир, вул. Лермонтовська, 5.

Фармакотерапевтична група. Снодійні та седативні засоби.

Код АТС N05C M.

Трава, кореневища та корені півонії незвичайної *Paeonia anomala* містять феноли, дубильні речовини органічні кислоти. Настойка півонії підвищує опір організму до гіпоксії, чинить спазмолітичну, протисудомну, антимікробну дію, має здатність підвищувати кислотність шлунка.

Показання для застосування.

Функціональні порушення центральної нервової системи (нейроциркуляторна дистонія за гіпертонічним типом, невротичні стани).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Артеріальна гіпотензія.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При тривалому застосуванні великих доз препарату необхідно контролювати кислотність шлунка в пацієнтів з тенденцією до її підвищення. Перед застосуванням збовтувати.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано застосування під час вагітності (діє абортивно) або у період годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. У період лікування настойкою півонії пацієнту слід утримуватися від керування транспортними засобами та виконання іншої роботи, яка потребує підвищеної уваги, швидких психічних і рухових реакцій.

Діти. Не рекомендується застосовувати препарат у педіатричній практиці через відсутність досвіду застосування.

Спосіб застосування та дози.

Настойку півонії приймати внутрішньо за 10–15 хвилин до їжі. Дорослим призначати по 15–20 крапель настойки 2–3 рази на добу.

Тривалість курсу лікування визначити індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Рекомендована тривалість лікування – 2 тижні, у разі необхідності курс лікування можна повторити після перерви (через 2–3 місяці).

Передозування.

При перевищенні рекомендованих доз спостерігаються зниження артеріального тиску, запаморочення, сонливість.

У разі передозування слід припинити застосування препарату і вжити заходів симптоматичної та підтримуючої терапії (відповідно до клінічного стану хворого).

Побічні ефекти.

Артеріальна гіпотензія, сонливість, загальна слабкість, а також розвиток алергічних реакцій (у тому числі висипи, свербіж, гіперемія, набряк).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат може потенціювати дію седативних і снодійних засобів, транквілізаторів, нейролептиків та антидепресантів із седативною дією.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 мл або по 100 мл у флаконах; по 50 мл або по 100 мл у флаконів пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

ПІВОНІЇ НАСТОЙКА (Paeoniae Tinctura)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 флакон містить настойки півонії незвичайної трави, кореневищ із коренями *Paeoniae anomala herba, rhizoma cum radicibus*) (1:10) (екстрагент – етанол 40 %) - 50 мл або 100 мл.

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина світло-коричневого кольору зі специфічним запахом; допускається утворення осаду при зберіганні.

Назва і адрес виробника.

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка,
4.

вул. Корольова, б.

Фармакотерапевтична група. Снодійні та седативні засоби.

Код АТС N05C M.

Трава, кореневища та корені півонії незвичайної *Paeonia anomala* містять феноли, дубильні речовини органічні кислоти. Настойка півонії підвищує опір організму до гіпоксії, чинить спазмолітину, протисудомну, антимікробну дію, має здатність підвищувати кислотність шлунка.

Показання для застосування.

Функціональні порушення центральної нервової системи (нейроциркуляторна дистонія за гіпертонічним типом, невротичні стани).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Артеріальна гіпотензія.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При тривалому застосуванні великих доз препарату необхідно контролювати кислотність шлунка в пацієнтів з тенденцією до її підвищення. Перед застосуванням збовтувати.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано застосовування під час вагітності (діє абортивно) або у період годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. У період лікування настойкою півонії пацієнту слід утримуватися від керування транспортними засобами та виконання іншої роботи, яка потребує підвищеної уваги, швидких психічних і рухових реакцій.

Діти. Не рекомендується застосовувати препарат у педіатричній практиці через відсутність досвіду застосування.

Спосіб застосування та дози.

Настойку півонії приймати внутрішньо за 10–15 хвилин до їжі. Дорослим призначати по 15–20 крапель настойки 2–3 рази на добу.

Тривалість курсу лікування визначити індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Рекомендована тривалість лікування – 2 тижні, у разі необхідності курс лікування можна повторити після перерви (через 2–3 місяці).

Передозування.

При перевищенні рекомендованих доз спостерігаються зниження артеріального тиску, запаморочення, сонливість.

У разі передозування слід припинити застосування препарату і вжити заходів симптоматичної та підтримуючої терапії (відповідно до клінічного стану хворого).

Побічні ефекти.

Артеріальна гіпотензія, сонливість, загальна слабкість, а також розвиток алергічних реакцій (у тому числі висипи, свербіж, гіперемія, набряк).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат може потенціювати дію седативних і снодійних засобів, транквілізаторів, нейролептиків та антидепресантів із седативною дією.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 мл або по 100 мл у флаконах; по 50 мл або по 100 мл у флаконів пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.