

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

АПІЛАК ГРІНДЕКС
(APILAC GRINDEKS)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: бджолине маткове молочко ліофілізоване;

1 г мазі містить 10 мг бджолиного маткового молочка ліофілізованого;

допоміжні речовини: парафін білий м'який, спирт цетиловий, гліцерин, парафін, натрію цетостеарилсульфат, спирт циннаміловий, метилпарабен (Е 218), вода очищена.

Лікарська форма. Мазь.

Мазь білого або білого зі злегка жовтуватим відтінком кольору зі специфічним запахом спирту циннамілового (гіацинту).

Назва і місце знаходження виробника.

АТ Талліннський фармацевтичний завод.

Тонді 33, 11316 Таллінн, Естонія.

Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення.

АТ «Гріндекс».

Вул. Крустпіле, 53, Рига, LV-1057, Латвія.

Фармакотерапевтична група. Дерматологічні засоби. Код АТС D11A X.

Бджолине маткове молочко - секрет, який виробляється алотрофічними залозами робочих бджіл та є біологічним стимулятором із тонізуючою, трофічною та антиспастичною дією. Препарат стимулює клітинний метаболізм та регенеративні процеси, покращує трофіку тканин.

Показання для застосування.

У комплексному лікуванні себореї, себореїної та мікробної екземи, нейродерміту, попрілостей.

Протипоказання.

- Підвищена чутливість до продуктів бджільництва або до інших допоміжних речовин, що входять до складу препарату;
- хвороба Аддисона.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат може викликати алергічні реакції.

Через можливість розвитку алергічних реакцій та загострення захворювання необхідно вперше наносити мазь на обмежені ділянки неушкодженої шкіри для встановлення індивідуальної чутливості. При відсутності небажаних реакцій можна наносити мазь на всю uszkodжену шкіру.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Відсутні клінічні дані щодо негативного впливу бджолиного маткового молочка ліофілізованого у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Невідома.

Діти. Препарат застосовують дітям від 2 років.

Спосіб застосування та дози.

Мазь слід наносити тонким шаром на uszkodжену поверхню 1-2 рази на добу у кількості

2-10 г (під пов'язку або безпосередньо на uszkodжену ділянку шкіри).

Тривалість курсу лікування становить від 1 тижня до 2 місяців.

Передозування.

Можливе посилення проявів побічних реакцій. У випадку передозування лікування слід припинити. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Залежно від індивідуальної чутливості та дозування, особливо на початку терапії, можливі такі побічні ефекти: шкірні алергічні реакції (висипання, свербіж, запалення), які зникають після припинення застосування препарату.

При виникненні небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та проконсультуватися з лікарем щодо подальшої терапії.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 г у тубах алюмінієвих; по 1 тубі в картонній пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.