

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ
(CARBO ACTIVATUS)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: вугілля активоване;
1 таблетка містить 0,25 г вугілля активованого;
допоміжні речовини: крохмаль картопляний.

Лікарська форма. Таблетки.

Таблетки чорного кольору з плоскою поверхнею.

Назва і місце знаходження виробника.

ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА».

Україна, 08130, Київська обл., Кисво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Грушевського, 60.

Фармакотерапевтична група. Ентеросорбенти. Препарати активованого вугілля. Вугілля медичне активоване. Код АТС А07В А01.

Вугілля рослинного походження, яке завдяки спеціальній обробці (активації) набуває великої сорбційної поверхні і здатне поглинати гази, алкалоїди, ендо- та екзотоксини та інші хімічні сполуки. Препарат нетоксичний, добре виводиться з організму через кишечник. У кишечнику не всмоктується і повністю виводиться з каловими масами через 8-24 години.

Показання для застосування.

- Гострі отруєння побутового, промислового та харчового походження;
- гострі отруєння лікарськими препаратами, отруєння алкалоїдами, солями важких металів;
- диспепсія, метеоризм, харчові токсикоінфекції.

Протипоказання.

- Підвищена чутливість до компонентів препарату
- виразки шлунково-кишкового тракту;
- шлункові кровотечі.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При супутній фармакотерапії вугілля активоване приймати за 1-1,5 години до або після прийому лікарських засобів або їжі у зв'язку з адсорбуючими властивостями препарату.

Особливі застереження.

При наявності гіповітамінозу, яким може супроводжуватися тривале застосування вугілля активованого, необхідно призначати вітаміни.

Кал після прийому препарату забарвлюється у чорний колір.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Даних про негативний вплив вугілля активованого у період вагітності або годування груддю немає.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти. Не застосовувати дітям до 3 років.

Спосіб застосування та дози.

При метеоризмі та диспепсії дорослим застосовувати від 1 до 3 таблеток 3-4 рази на добу.

При отруєннях – внутрішньо дорослим у дозі 20-30 г на прийом у вигляді водної суспензії (на 1-2 склянки води). Така суспензія використовується і для промивання шлунка.

При підвищеній кислотності дорослим призначати 12 г препарату 3-4 рази на добу. Для досягнення швидшого та вираженого ефекту таблетки можна подрібнити та застосовувати у вигляді водної суспензії (на 0,5 склянки води).

Курс лікування при гострих захворюваннях становить 3-5 днів, при хронічних захворюваннях, зумовлених ендогенними інтоксикаціями, – 10-15 днів.

Передозування.

Значне перевищення максимальних разових доз призводить до побічних реакцій (нудота, блювання та запори), які зникають після зменшення дози або відміни препарату.

Побічні ефекти.

Можливі прояви підвищеної чутливості, запори або поноси, які легко усуваються відміною препарату і призначенням симптоматичної терапії. Можливий розвиток нудоти та блювання.

При тривалому застосуванні може спостерігатись нестача вітамінів, гормонів, жирів, білків, що потребує лікарської корекції.

У разі появи будь-яких небажаних явищ пацієнту необхідно звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Завдяки адсорбуючим властивостям вугілля активоване здатне зменшувати ефективність лікарських засобів, які приймають одночасно з ним. Тому при супутній фармакотерапії вугілля активоване приймати за 1-1,5 години до або після прийому лікарських засобів.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 30°C, окремо від речовин та матеріалів, які виділяють гази та пари. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Таблетки № 10 у блістері, № 30 (№ 10 x 3) по 3 блістери у паці.

Категорія відпуску. Без рецепта.