

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

СЛАБІНОРМ-ФАРМЕКС
(SLABINORM-PHARMEK)

Склад:

діюча речовина: glycerol;

1 супозиторій містить гліцерину 0,88 г або 2,63 г;

допоміжні речовини: натрію карбонат декагідрат; кислота стеаринова; макрогол 400.

Лікарська форма. Супозиторії.

Основні фізико-хімічні властивості: супозиторії напівпрозорі, майже безбарвні або зі слабким жовтуватим відтінком, з поверхнею, що маже, гігроскопічні. Допускається наявність ліycopодібно́ї заглибини повітряного стрижня, помутніння супозиторіїв, незначне розм'якшення поверхневого шару, наявність конденсату на упаковці.

Фармакотерапевтична група.

Проносні засоби.

Код АТХ А06 АХ01.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

У чистому вигляді гліцерин має подразнювальну дію, яка зникає при додаванні води (до 30-50 %), вазеліну, ланоліну. При введенні у пряму кишку супозиторії чинять легку подразнювальну дію на слизову оболонку і рефлекторним шляхом стимулюють дефекацію.

При застосуванні у вигляді ректальних супозиторіїв полегшує виведення калових мас.

Ефект лікарського засобу настає протягом 5-30 хвилин.

Фармакокінетика.

Після ректального введення всмоктування слабе, перебування в організмі короткочасне.

Практично не надходить до системного кровотоку та не надає системних побічних ефектів.

Клінічні характеристики.

Показання. Запори різної етіології (коли застосування пероральних препаратів неможливе).

Противоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Кишкова непрохідність, ниркова недостатність, апендицит, кровотечі, діарея, геморої в стадії загострення, тріщини заднього проходу, запальні захворювання, пухлини прямої кишки, недиагностований біль у животі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат може взаємодіяти з іншими лікарськими засобами.

Супозиторії з гліцерином можуть послабити дію інших ліків, які застосовуються ректально. Необхідно дотримуватись кількогодинного інтервалу.

Особливості застосування.

Не рекомендується застосовувати супозиторії курсом лікування більше 1 тижня.

З обережністю застосовувати при порушенні функції нирок, алергії, нудоті, блюванні.

Перед та після застосування супозиторіїв слід ретельно вимити руки.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності препарат можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для вагітної перевищує потенційний ризик для плода.

Невідомо, чи екскретується гліцерин у грудне молоко, тому препарат лікар може призначати тільки тоді, коли очікувана користь для жінки, яка годує груддю, перевищує потенційний ризик для дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують по 1 супозиторію 1 раз на добу через 15-20 хв після сніданку.

Супозиторії вводять у пряму кишку і тримають там протягом не менше 5 хв, якщо не відбувається випорожнення раніше. Залишки супозиторіїв виводяться з організму разом із каловими масами. За необхідності дозу можна збільшити до 2 супозиторіїв на добу.

Дорослим і дітям віком від 5 років призначають по 1 супозиторію (що містить 2,63 г гліцерину) 1 раз на добу. Дітям до 5 років – 1 супозиторій (що містить 0,88 г гліцерину) 1 раз на добу.

Діти.

Немає обмежень.

Передозування.

Часте рідке випорожнення. Проходить самостійно після відміни препарату.

Побічні реакції.

Можливі алергічні реакції; біль, нудота, блювання, шлунково-кишкова кровотеча.

При тривалому застосуванні спостерігалися подразнення і неприємні відчуття в прямій кишці; іноді катаральний проктит.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 5 супозиторіїв у стрипі, по 1 або 2 стрипи у паці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100.