

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ГЛІЦЕРОЛ ЄВРО

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: glycerol;

1 супозиторій містить гліцерину 1 г або 2 г;

допоміжні речовини: желатин, вода очищена

Лікарська форма. Супозиторії ректальні.

Свічки із студенистої маси, напівпрозорі жовтого кольору, однорідні на вигляд, без запаху або з легким запахом желатину.

Назва і місцезнаходження виробника.

Лабораторис Басі Індастріа Фармасьютіка С. А., Португалія.

Парк Індастріал Мануель Лоренсо Феррейра , діл.15, 16, 3450-232 Мортагуа, Португалія.

Фармакотерапевтична група.

Інші проносні засоби. Код АТС А06А Х01.

У чистому вигляді гліцерин має подразнювальну дію, яка зникає при додаванні води (до 30-50 %), вазеліну, ланоліну. При застосуванні у вигляді ректальних супозиторіїв полегшує виведення калових мас. При введенні у пряму кишку гліцеринові супозиторії чинять легку подразнювальну дію на слизову оболонку та рефлекторним шляхом ініціюють процес дефекації.

Показання для застосування.

Симптоматичне лікування запорів різної етіології (коли застосування пероральних препаратів неможливе)

Протипоказання.

Підвищена чутливість до гліцерину або до будь-якого інгредієнта препарату. Ниркова недостатність, синдром подразненого кишечника, кишкова непрохідність, апендицит, кровотеча, діарея, геморої у стадії загострення, тріщини заднього проходу, запальні захворювання, пухлини прямої кишки, недиагностований біль у животі, геморагічний ректоколіт.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не рекомендується застосовувати супозиторії курсом лікування більше 1 тижня.

З обережністю застосовувати при порушенні функції нирок, алергії, нудоті, блюванні.

Перед та після застосуванням супозиторіїв слід ретельно вимити руки.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності препарат можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода.

Невідомо чи екскретується гліцерин у грудне молоко, тому цей лікарський засіб застосовується тоді, коли, на думку лікаря, очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Дітям старше 2 років препарат застосовують у дозі 1 г гліцерину.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують по 1 супозиторію 1 раз на добу через 15-20 хв після сніданку.

Супозиторій вводять у пряму кишку та утримають там протягом не менше 5 хв, якщо не відбувається випорожнення раніше. Залишки супозиторіїв виводяться з організму разом із каловими масами. За необхідності дозу можна збільшити до 2 супозиторіїв на добу.

Разова доза дорослим та дітям старше 6 років: 1 супозиторій по 2 г або 2 супозиторія по 1 г.

Разова доза дітям віком від 2 до 6 років: 1 супозиторій по 1 г.

Лікування запорів не повинно перевищувати 7 днів.

Передозування.

Симптоми: часте рідке випорожнення. Проходить самостійно після відміни препарату.

У разі передозування слід відмінити препарат.

Побічні ефекти.

Описано деякі наслідки та симптоми, які зникають після закінчення застосування, зокрема, ректальний дискомфорт, подразнення, печіння, кольки та спазми. Крім того, у рідких випадках, може спричинити гіперемію слизової оболонки прямої кишки, а у поодиноких випадках – невеликі кровотечі або виділення слизу.

Можливі алергічні реакції, біль, нудота, блювання, шлунково-кишкова кровотеча.

При тривалому застосуванні спостерігалися подразнення і непрямі відчуття у прямій кишці; іноді – катаральний проктит.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Супозиторії з гліцерином можуть послабити дію інших ліків, які застосовуються ректально. Необхідно дотримуватись кількохгодинного інтервалу.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 1 або 2 термоізоляційні білі непрозорі ПВХ пластинки по 6 свічок кожна.

Категорія відпуску. Без рецепта.