

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

АЛЛОТОН™

Склад лікарського засобу:

100 мл містять: *діючі речовини*: настояйка суміші лікарської рослинної сировини (1:5): коренів лопуха справжнього (*Arctium lappa*) – 5,6 г, плодів софори японської (*Sophora japonica*) – 5,6 г, кореневища лопуха звичайної (*Acorus calamus*) – 3,2 г, листя кропиви дводомної (*Urtica dioica*) – 2,8 г, шишок хмелю звичайного (*Humulus lupulus*) – 2,8 г (екстрагент – етанол 40 %);

допоміжні речовини: крім екстрагенту, відсутні

Лікарська форма. Розчин нашкірний.

Прозора рідина від світло коричневого до коричневого кольору. Під час зберігання допускається утворення осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПАТ «Лубнифарм».

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Петровського, 16.

Назва і місцезнаходження заявника.

ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРО-ФАРМА».

Україна, 03115, м. Київ, вул. М. Котельникова, 1, оф. 97.

Фармакотерапевтична група.

Препарати для лікування захворювань шкіри. Код АТСD11АХ.

Комплексний препарат рослинного походження. Бологічно активні складові лопуха виявляють знеболювальні, протисвербжні, антисептичні та епітелізуючі властивості – відновлюють структуру та функції шкіри. Екстрактивні речовини кропиви дводомної покращують кровообіг в капілярній системі шкіри, стимулюють обмін речовин і трофічні процеси – покращують живлення шкіри голови. Біологічно активні речовини аїру очеретяного обумовлюють протизапальну та антисептичну дію. Компоненти шишок хмелю звичайного стимулюють процес епітелізації шкіри. Вітамін Р з софори японської укріплює стінки кровоносних судин, зменшує проникнення і ламкість капілярів – збагачує киснем шкіру голови.

Препарат має загальнозмцнювальну, дермотонізуючу, капілярозміцнювальну, антисептичну, фуністатичну дію завдяки фармакологічно активним речовинам, які екстрагуються із суміші лікарських рослин, що входять до складу препарату.

Показання для застосування.

Різні форми алопеції, при випадінні волосся внаслідок вікових змін, для припинення генетично обумовленого випадіння волосся. Для профілактики сезонного випадіння волосся і покращення його структури; при інтенсивному випадінні волосся, пов'язаному з нерациональним харчуванням, стресами, загостренням хронічних запальних хвороб, порушенням функцій залоз внутрішньої секреції; при випадінні волосся у вагітних і жінок, які годують дитину груддю; при ушкодженні волосся, пов'язаному з фізичними, хімічними та механічними факторами; при себорейному дерматиті; при наявності лупи.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Уникати потрапляння в очі. Не наносити препарат при порушенні цілісності шкіри голови.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат застосовують у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Не слід застосовувати препарат дітям віком до 14 років.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим та дітям віком від 14 років препарат наносити на суху або помірно вологу шкіру голови. Разова доза становить 20-30 натискань дозатора. Після нанесення препарат втирати у шкіру голови легкими масажними рухами. Мити волосся перед кожним нанесенням препарату необов'язково, тому рекомендується звичайний режим миття волосся. Ополіскувати волосся після нанесення не потрібно.

Кратність застосування – 1 раз на добу. Курс лікування – від 1 до 3 місяців, після чого слід зробити перерву. З урахуванням сезонності випадіння волосся, з профілактичною метою препарат рекомендується застосовувати 2 рази на рік, весною і восени, при інтенсивному випадінні волосся – повторними циклами по 2-3 місяці з перервами на 1 місяць.

Передозування.

Не описано.

Побічні ефекти.

При застосуванні препарату можливі реакції гіперчутливості.

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 100 мл у флаконах із розпилювачем, по 1 флакону в пачці з картону.

Категорія відпуску.

Без рецепта.