ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЮНІЕНЗИМ® з МПС
(UNIENZYME® c MPS)

клад лікарського засобу:
оч і речовини: 1 таблетка, вкрита оболонкою, містить грибкової діастази (1:800) – 20 мг, папаїну – 30 мг, симетикону (МПС)– 50 мг, вугілля активованого – 75 мг, нікотинаміду – 25 мг;
поміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, лактоза, моногідрат, акація, натрію бензоат (Е 211), желатин, кремнію діоксид колоїдний безводний, тальк, магнію стеарат, натрію кармелоза, сахароза, олія рицинова, кальцію обонат, вугілля рослинне, шелак, віск карнаубський, віск білий.

карська форма. Таблетки, вкриті оболонкою.
блетки чорного кольору, овальної форми, вкриті цукровою оболонкою, із написом «UNICHEM» білими літерами з одного боку таблетки.

зва і місцезнаходження виробника.
нікем Лабораторіз Лімітед, Індія
31 і С-32, Інд. Ерія Мірут Роад, Газіабад 201 003, Індія.
ichem Laboratories Limited, India
31&32, Ind. Area, Meerut Road, Ghadziabad – 201 003, India.

армакотерапевтична група.
соби, що покращують травлення, включаючи ферменти. Препарати ферментів.
ТС А09А А.
ніензим® з МПС – комбінований препарат, що містить грибкову діастазу та папаїн, які діють як ферменти, та нікотинамід, симетикон, активоване вугілля, які сприяють полегшенню травлення.
рментативні препарати застосовують для лікування у пацієнтів з дефіцитом будь-якого з ферментів, необхідних для перетравлювання вуглеводів, жирів та білків. При такому захворюванні пацієнт відчуває симптоми диспепсії, уття кишечнику, відрижку, скупчення газів і переповнень та дискомфорт у черевній порожнині, а також порушення випорожнень.
ибкова діастаза – це фермент, одержаний при вирощуванні штаму *Aspergillus oryzae*. Він містить два типи амілази, а саме: альфа-амілазу і бета-амілазу. Ці амілази мають специфічну активність щодо перетворення крохмалю у кстрозу, мальтозу. Ступінь амілолітичної активності грибкової діастази у таблетках становить 1:800. Це означає, що 1 частина грибкової діастази розщеплює 800 частин вареного крохмалю, що надходить з їжею. Грибкова стаза також має деякі протеазні та ліпазні властивості. Тобто вона має певну здатність до розщеплення білків та жирів.
паїн – це фермент або суміш ферментів, які розщеплюють білки і мають рослинне походження. Папаїн отримують із соку неспілого плода *Carica papaya*. Фермент складається в основному з суміші папаїну та хімопапаїну, атних розщеплювати білки на ферменти. Папаїн має протеолітичну активність, подібну до природного ферменту пепсину. Перевага папаїну над пепсином полягає в тому, що він є активним у широкому діапазоні значень pH д 3 до 10,5) порівняно з пепсином, який неактивний при значенні pH, понад 4,5. Таким чином, папаїн є активним при різних значеннях pH. Отже, він корисний навіть при ахлоргідрії або при гіперхлоргідрії. Унаслідок цього паїн використовується як один з інгредієнтів ферментативних препаратів, призначених для поліпшення розщеплення білків.
котинамід бере участь як коензим у метаболізмі вуглеводів. Нікотинамідні коферменти (НАД і НАДФ) необхідні для життєдіяльності всіх клітин. Важливою функцією їх є участь у тканинному диханні (перша ланка хального ланцюга) та енергетичному обміні клітини. Недостатня кількість цієї сполуки виникає зазвичай при незбалансованій дієті у пацієнтів старшого віку. Дефіцит нікотинаміду може призвести до зменшення кислоти у лунку, що впливає на процеси травлення та кишкової абсорбції; внаслідок нестачі нікотинаміду може також виникнути непереносимість лактози, що є одним із механізмів, які лежать в основі виникнення діареї внаслідок достатності даної сполуки.
метикон (метилполісилоксан) – нетоксична інертна поверхневоактивна речовина з властивостями піногасника на основі кремнію. Симетикон зменшує утворення газів у кишечнику. Він діє шляхом зменшення поверхневого тягу пухирців газу, що утворюються в кишечнику при метеоризмі. Звільнений газ абсорбується або видаляється природним шляхом. Симетикон не впливає на шлункову секрецію і на всмоктування харчових речовин. іметикон зменшує здуття живота та біль, спричинений підвищеним метеоризмом. Симетикон значно поліпшує стан при метеоризмі, аерофагії, розладах травлення, всмоктування та виведення. Таким чином, даний компонент є рисним додатком до ферментних складових препарату.
гілля активоване – ентеросорбент. Спеціально оброблене вугілля має велику поверхневу активність, адсорбує гази, алкалоїди, ендо- та екзотоксини та інші хімічні сполуки. Вугілля активоване у складі Юніензиму® з МПС діє ентеросорбент і детоксикуючий засіб, забезпечує адсорбцію газів та токсинів, що утворюються при розладі травлення, адсорбує речовини, що погано розчиняються, зменшує об'єм вмісту в кишечнику, і у такий спосіб иносить полегшення при здутті живота та диспепсії, діючи комплексно разом з ферментами.
ким чином, препарат включає всі необхідні інгредієнти, які допоможуть нормалізувати процеси перетравлення основних поживних речовин, таких як вуглеводи, жири та білки. Крім того, він також сприяє полегшенню путніх порушень травлення, таких як здуття, відрижка, відчуття переповненості та накопичення газів у черевній порожнині.
армакокінетика не вивчалась.

оказання до застосування.
мптоматичне лікування таких порушень травлення як диспепсія, відрижка, відчуття дискомфорту і переповненості у черевній порожнині, здуття.

ротипоказання.
двищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату. Порушення функції печінки, кишкова непрохідність, виразка шлунка і дванадцятипалої кишки (через вміст у препараті нікотинової кислоти).

алежні заходи з безпеки при застосуванні.
репарат містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактазної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.
репарат містить сахарозу, що слід враховувати хворим на цукровий діабет.
тивоване вугілля може забарвлювати калові маси у чорний колір.
ід з обережністю призначати прийом нікотинової кислоти пацієнтам, які хворіли раніше на виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, а також пацієнтам, хворим на цукровий діабет, подагру.

обливі застереження.
стосування у період вагітності або годування груддю.
рекомендується застосування препарату у період вагітності або годування груддю.

атність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
репарат не впливає на здатність керувати автомобілем або виконувати роботи, що потребують підвищеної уваги.

ти.
застосовують дітям віком до 7 років.

осіб застосування та дози.
рослим та дітям старше 7 років застосовують по 1 таблетці, запиваючи достатньою кількістю води, 1-3 рази на добу після прийому їжі.
ивалість лікування залежить від перебігу захворювання пацієнта.

ередозування.
сі не повідомлялося про випадки навмисного або випадкового передозування.
редозування нікотинаміду може спричинити біль у животі, посилення перистальтики, можлива нудота, інколи блювання. При передозуванні варто призначити підтримуючу та симптоматичну терапію після промивання шлунка.

бічні ефекти.
ричиненні нікотинамідом:
окремих випадках можуть проявлятися алергічні реакції у вигляді гіперемії шкіри, висипань (дрібноточкових, плямистих, уртикарних), іноді – свербіж, підвищена чутливість або ідіосинкратичні реакції. Великі дози можуть ричиняти біль у животі, загострення виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, нудоту, блювання, понос, відчуття тепла у кінцівках, сухість шкіри, артеріальну гіпотензію, короткочасний головний біль, аритмію, порушення перантності до глюкози.
ричиненні вугіллям активованим:
жливе виникнення запору, діареї, нудоти, блювання; при тривалому застосуванні можливий розвиток дефіциту вітамінів, гормонів, жирів, білків, що потребує відповідної лікарської корекції.
бічної дії грибкової діастази, папаїну, симетикону (МПС) не спостерігалося.

аємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
тивоване вугілля має здатність зменшувати абсорбцію багатьох лікарських препаратів зі шлунково-кишкового тракту, тому варто уникати одночасної пероральної терапії. Отже, препарат слід приймати за 2 години до і через 1 дину після прийому іншого лікарського засобу, особливо при використанні пероральних антидотів на зразок метіоніну. Нікотинова кислота у складі препарату може збільшити потребу в інсуліні і пероральних отидіабетичних засобах.
ри одночасному пероральному прийомі активоване вугілля зменшує силу дії блювотного кореня та інших речовин, що спричиняють блювання.

рмін придатності. 3 роки.

лови зберігання.
берігати в сухому, темному і недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

паковка. Таблетки, вкриті оболонкою по 2 таблетки у стрипах, по 1 стрипу в коробці; по 10 таблеток у стрипах, по 2 стрипи в коробці; по 10 таблеток у стрипах, по 2 стрипи в коробці, по 5 коробок в упаковці.

тегорія відпуску. Без рецепта.