

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства охорони**  
**здоров'я України**  
№ \_\_\_\_\_

**Ресетраційне посвідчення**  
№ \_\_\_\_\_

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**ЦЕЛЬ Т**  
**(ZEEL® Т)**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 100 г препарату містять: Acidum silicicum D6 – 1 г, Acidum thiocticum D6 – 0,01 г, Arnica montana D2 – 0,3 г, Cartilago suis D2 – 0,001 г, Coenzym A D6 – 0,01 г, Embryo totalis suis D2 – 0,001 г, Funiculus umbilicalis suis D2 – 0,001 г, Nadidum D6 – 0,01 г, Natrium diethylloxalaceticum D6 – 0,01 г, Placenta totalis suis D2 – 0,001 г, Rhus toxicodendron D2 – 0,27 г, Sanguinaria canadensis D2 – 0,225 г, Solanum dulcamara D2 – 0,075 г, Sulfur D6 – 0,27 г, Symphytum officinale D8 – 0,75 г;

*допоміжні речовини:* спирт цетостеариловий (тип А) емульгований, станол 96 %, парафін в'язкий, мінеральна, парафін білий м'який, вода очищена.

**Лікарська форма.** Мазь.

М'яка мазь від білого до жовто-білого кольору з незгріклим запахом.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ.  
Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/  
Biologische Heilmittel Heel GmbH.  
Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

Препарат чинить протизапальну, аналгетичну, хондропротекторну, регенеруючу дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

**Показання для застосування.**

Артрози (гонартрози, поліартрози, спондилоартрози), плечолопатковий періартрит, тендопатії.

**Противоказання.**

Підвищена чутливість до рослин родини складноцвітих (у т.ч. *Arnica*), родини площца отруйного або до інших компонентів препарату.

Отформатовано: Цвет шрифта: Авто

Отформатовано: Цвет шрифта: Авто

#### **Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Мазь слід наносити тільки на неушкоджену шкіру.

При утримуванні симптомів чи погіршенні стану необхідно проконсультуватися з лікарем.

#### **Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Не застосовують.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.* Не впливає.

*Діти.* Препарат рекомендований для застосування дітям віком від 6 років.

#### **Спосіб застосування та дози.**

Дорослим і дітям від 6 років наносити 4-5 см мазі на шкіру в ділянках уражених суглобів та сухожилів та втирати легкими рухами 2-5 разів на добу.

Курс лікування – 3-6 тижнів.

#### **Передозування.**

Не відзначалося.

#### **Побічні ефекти.**

У дуже поодиноких випадках можуть спостерігатися реакції гіперчутливості або місцеві алергічні шкірні реакції, у випадку яких застосування препарату необхідно припинити. Цетилстеариловий спирт може спричинити місцеві шкірні реакції (контактний дерматит).

#### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Сумісний з іншими лікарськими засобами місцевої та загальної дії.

#### **Термін придатності.** 3 роки.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

#### **Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

#### **Упаковка.**

Туба на 50 г у картонній коробці.

#### **Категорія відпуску.** Без рецепта.

#### **Дата останнього перегляду.**

Отформатовано: Цвет шрифта: Авто

Отформатовано: Цвет шрифта: Авто

Отформатовано: Цвет шрифта: Авто

Отформатовано: Цвет шрифта: Авто

Отформатовано: Цвет шрифта: Авто

Отформатовано: Основной текст, По ширине, Поз.табуляции: 13,5 см, по левому краю + нет в 1,25 см