

Інструкція про застосування МІБП ЙОГУРТ РОЗЕЛЬ

Бактеріальний препарат для нормалізації та корекції мікрофлори кишечника

Загальна характеристика:

Основні властивості лікарської форм: кожна таблетка містить 200 мільйонів живих ліофілізованих молочнокислих бактерій, що нормалізують мікрофлору кишечника. Препарат має вигляд круглої таблетки, від білого кольору до кольору слонової кістки з маленькими бежевими вкрапленнями.

Якісний та кількісний склад

Діючі речовини - *Lactobacillus rhamnosus* R0011, *Lactobacillus rhamnosus* R0049, *Lactobacillus acidophilus* R0052, *Йогурт культура* (*Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus delbruesckii* ssp. *bulgaricus*)

Допоміжні речовини - лактоза, аскорбінова кислота, стеарат магнію, мікрокристалічна целюлоза, цукроза.

Форма випуску. Таблетки № 100.

Код АТС . А 07 FА 01. Лактобактерії.

Імунологічні та біологічні властивості

Молочнокислі бактерії нормалізують мікрофлору кишечника та процес травлення (особливо під час та після антибіотикотерапії). Знижують рівень холестерину в крові. Знижують дію гнилісних бактерій та пригнічують розвиток патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів. Розщеплюють лактозу, усувають нетолерантність організму до сахарози.

Показання для застосування

Таблетована форма живих клітин молочнокислих бактерій використовується для профілактики та лікування дисбактеріозів та гастроентеритів різного походження, для нормалізації мікрофлори кишечника та процесу травлення особливо під час та після антибіотикотерапії. ЙОГУРТ РОЗЕЛЬ одночасно приймають зі всіма класами антибіотиків за виключенням антибіотиків пеніцилінового та цефалоспоринового ряду. Препарат підвищує імунітет та загальну опірність організму до захворювань.

Спосіб застосування та дози

Таблетки приймають з невеликою кількістю води під час їжі. Для дітей таблетки можна подрібнити та змішати з прохолодною водою або прохолодною їжею.

ПРОФІЛАКТИКА:

Дітям від 3 років і більше 2 таблетки на день.

Дорослим 2-5 таблетки на день.

Термін прийому не менше 2-3 тижнів.

ЛІКУВАННЯ:

Дітям від 3 років і більше 2 таблетки 2-3 рази на день.

Дорослим 2-5 таблетки 3 рази на день.

Тривалість прийому: до зникнення симптомів захворювання. Надалі слід перейти до профілактичного застосування.

При прийомі антибіотиків (per os) ЙОГУРТ РОЗЕЛЬ слід приймати разом або протягом

двох годин після прийому антибіотиків.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

ЙОГУРТ РОЗЕЛЬ одночасно приймають зі всіма класами антибіотиків за виключенням антибіотиків пеніцилінового та цефалоспоринового ряду. При прийомі антибіотиків (per os) ЙОГУРТ РОЗЕЛЬ слід приймати разом або протягом двох годин після прийому антибіотиків.

На теперішній час немає інших відомостей про взаємодію препарату ЙОГУРТ РОЗЕЛЬ з іншими лікарськими засобами.

Передозування

Неможливе.

Побічна дія

Не виявлена.

Умови зберігання

Препарат зберігають при температурі не вище 4°C.

Відкриту пляшечку зберігати в сухому місці.

Термін придатності

2 роки.

Пакування

100 таблеток у пластиковій пляшечці.

Виробник.

Institute Rosell Inc. / Інститут Розель Інк.

Адреса: 8480, boul. St-Laurent, Montreal, Quebec, Canada, H2P 2M6 / 8480 бульвар Св. Лаврентія, Монреаль, Квебек, Канада, H2P 2M6.