

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГЛОДУ НАСТОЙКА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 флакон (банка) препарату містить: настойку глоду плодів (*Crataegi fructus*) (1:10) (екстрагент – етанол 70 %) – 50 мл або 100 мл; 1 мл препарату містить 0,65 мл етанолу;

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина жовтувато-буруватого кольору. Під час зберігання можливе випадання осад.

Назва і місце знаходження виробника.

ПАТ «Біолік»

24321, Вінницька обл., м. Ладизин, вул. Леніна, 118.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються у кардіології. Код АТС С01Е В04.

Біологічно активні речовини, що містяться у плодах глоду, посилюють кровообіг у коронарних судинах та судинах головного мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів і зменшують його збудливість, що призводить до певного посилення скорочень серцевого м'яза. Препарат добре всмоктується при прийомі внутрішньо. Ефект настає через 30 хвилин – 1 годину.

Показання для застосування.

Функціональні розлади діяльності серцево-судинної системи (у тому числі нейроциркуляторна дистонія), а також як допоміжний лікарський засіб при легких формах порушень серцевого ритму (миготлива аритмія, пароксизмальна тахікардія).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Виражена артеріальна гіпотензія і брадикардія.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат не рекомендується приймати під час їди, щоб уникнути взаємодії з компонентами їжі.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказане.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Препарат містить етиловий спирт та може спричинити сонливість, тому у період застосування препарату слід утриматися від керування автотранспортними засобами або роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Діти.

Дітям віком до 12 років протипоказане застосування препарату.

Спосіб застосування та дози.

Застосовувати внутрішньо до їди. Дорослим рекомендується приймати по 20 крапель настойки 3 рази на добу, дітям від 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3 рази на добу до досягнення стабільного лікувального ефекту. Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально.

Передозування.

Передозування спричиняє зниження артеріального тиску, сонливість, брадикардію. Слід припинити прийом препарату, терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Сонливість, значне уповільнення серцевого ритму, алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Глоду настойка має потенціювати дію серцевих глікозидів та антиаритмічних засобів. Застосування із солями алкалоїдів не рекомендується у зв'язку з можливістю утворення негативних комплексів. Не слід застосовувати препарат разом із цизапридом. Може посилювати дію снодійних, седативних, гіпотензивних засобів.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 мл або по 100 мл у флаконах, або по 100 мл у банках.

Категорія відпуску. Без рецепта.