

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

МЕТРО-АДНЕКС-ІН'ЄЛЬ
(METRO-ADNEX-INJEEL®)

Склад:

діючі речовини: 1,1 мл розчину містять: Apis mellificaD10 – 1,1 мг, Apis mellificaD30 – 1,1 мг, Apis mellificaD200 – 1,1 мг, Cimicifuga racemosa D200 – 2,2 мг, Cimicifugaracemosa D30 – 2,2 мг, Cimicifugaracemosa D10 – 2,2 мг, Hydrargyrum bichloratumD200 – 1,1 мг, Hydrargyrum bichloratumD10 – 1,1 мг, Hydrargyrum bichloratumD30 – 1,1 мг, Lachesis D10 – 1,1 мг, Lachesis D30 – 1,1 мг, Lachesis D200 – 1,1 мг, Lachesis D1000 – 1,1 мг, Liliium lancifoliumD30 – 1,1 мг, Liliium lancifoliumD200 – 1,1 мг, Liliium lancifoliumD10 – 1,1 мг, Lycopodium clavatumD30 – 1,1 мг, Lycopodium clavatumD10 – 1,1 мг, Lycopodium clavatumD1000 – 1,1 мг, Lycopodium clavatumD200 – 1,1 мг, Pulsatilla pratensis D200 – 1,65 мг, Pulsatilla pratensis D1000 – 1,65 мг, Pulsatilla pratensis D10 – 1,65 мг, Pulsatilla pratensis D30 – 1,65 мг, Vespa crabro D10 – 1,65 мг, Vespa crabro D30 – 1,65 мг, Vespa crabro D200 – 1,65 мг;

допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Лікарська форма. Розчин для ін'єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин без запаху.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Препарат чинить протизапальну, антиексудативну, дезінтоксикаційну, імунокоригуючу дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації його функцій.

Фармакокінетика.

Для гомеопатичних препаратів не визначається.

Клінічні характеристики.

Показання.

Аднексит; параметрит, ендометрит; вагініт; дисменорея; міжменструальний біль; клімактеричний невроз.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Випадки негативного впливу невідомі.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Невідома.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза: дорослим і дівчатам пубертатного віку – 1 ампула по 1,1 мл. Застосовувати у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньошкірних (в акупунктурні точки), внутрішньовенних (струминно) ін'єкцій або перорально (розчинити разову дозу в 50 мл води та випити протягом доби) 1-3 рази на тиждень. У гострих випадках – 1 ампула щоденно протягом 3-5 днів.

Курс лікування – 3-6 тижнів.

Діти.

Препарат рекомендований для застосування, починаючи з періоду статевого дозрівання.

Передозування. Не відзначалося.

Побічні реакції

У поодиноких випадках можуть виникати алергічні реакції, реакції у місці введення або підвищене слиновиділення внаслідок індивідуальної чутливості до гомеопатичної діючої речовини Hydrargyrum bichloratum (ртуть), у такому випадку необхідно припинити застосування препарату і звернутися до лікаря.

Термін придатності. 5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Упаковка. 5 ампул та 100 (5x20) ампул по 1,1 мл у картонній коробці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/
Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/
Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.