

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування лікарського засобу  
**АНАФЕРОН**

**Склад:**

дюча речовина: 1 таблетка містить антитіла до гамма інтерферону людини афінно очищенні: суміш гомеопатичних розведень С12, С30 та С200 – 3 мг;  
допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат.

**Лікарська форма.** Таблетки.

**Основні фізико-хімічні властивості:**

Таблетки плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою, від білого до майже білого кольору. На одному плоскому боці з рискою нанесено напис MATERIA MEDICA, на іншому плоскому боці нанесено напис ANAFERON.

**Фармакотерапевтична група.** Гомеопатичний препарат.

**Фармакологічні властивості.**

Препарат застосовується для лікування та профілактики ГРВІ та грипу. При профілактичному та лікувальному застосуванні чинить противірусну дію. Експериментально та клінічно доведена ефективність стосовно вірусів грипу, парагрипу, іркусів простого герпесу 1 та 2 типів (лабіальний герпес, геніталійний герпес), інших герпесвірусів (вітряна віспа, інфекційний мононуклеоз), ентеровірусів, вірусу кліщового енцефаліту, ротавірусу, коронавірусу, каліцивірусу, аденоїрусу, респіраторно-синцитіального вірусу (РС-вірусу). Препарат знижує концентрацію вірусу в уражених тканинах, діє на систему ендогенних інтерферонів та пов'язаних з ними цитокінами, індукує утворення ендогенних «ранніх» інтерферонів (ІФН α/β) та γ-інтерферону (γ-ІФН).

Має антимутагенні властивості.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Профілактика та лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій (у тому числі грипу).

Комплексна терапія інфекцій, спричинених герпесвірусами (інфекційний мононуклеоз, вітряна віспа, лабіальний герпес, геніталійний герпес).

Комплексна терапія і профілактика рецидивів хроничної герпесвірусної інфекції, у тому числі лабіального та геніталіального герпесу.

Комплексна терапія і профілактика інших гострих та хронічних вірусних інфекцій, спричинених вірусом кліщового енцефаліту, ентеровірусом, ротавірусом, коронавірусом, каліцивірусом.

Комплексна терапія вторинних імунодефіцитних станів різної етіології, у тому числі профілактика та лікування ускладнень вірусних і бактеріальних інфекцій.

**Протипоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.**

Винайдік в несумісності з іншими лікарськими засобами не зареєстровано.

У разі необхідності препарат можна застосовувати сумісно з іншими противірусними, антибактеріальними та симптоматичними засобами.

**Особливості застосування.**

До складу препарату входить лактози моногідрат, у зв'язку з чим його не рекомендується призначати пацієнтам із природженою галактоземією, синдромом мальабсорбції глюкози або при вроджений лактазній недостатності.

**Застосування у період вагітності і або годування груддю.**

Дані про ефективність та безпеку застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутні, тому його не слід призначати у ці періоди.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

**Способ застосування та дози.**

Препарат приймають внутрішньо по 1 таблетці за 30 хв до або через 30 хв після прийому їжі. Таблетку тримають у роті (бажано не розжувати та не ковтаючи) до повного розчинення.

ГРВІ, грип, кишкові інфекції, герпесвірусні інфекції, нейроінфекції.

Лікування потрібно починати як можна раніше при появі перших ознак гострої вірусної інфекції за такою схемою: перші 2 години препарат приймають кожні 30 хв (5 прийомів), потім протягом першої доби – ще 3 таблетки через рівні проміжки часу (усього 8 таблеток протягом першої доби). Починаючи з 2-ї доби й надалі препарат приймають по 1 таблетці 3 рази на добу до повного одужання.

За відсутності покращення на третій день лікування препаратом гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу необхідно звернутися за консультацією до лікаря.

Для профілактики приймають по 1 таблетці 1 раз на добу щоденно протягом 1-3 місяців (протягом усього епідемічного сезону).

Геніталійний герпес. При гострих проявах геніталійного герпесу приймають через рівні проміжки часу за такою схемою: 1-3 день – по 1 таблетці 8 разів на добу, у подальшому – по 1 таблетці 4 рази на добу не менше 3 тижнів.

Для профілактики рецидивів в хронічній герпесвірусній інфекції – по 1 таблетці на добу. Рекомендована тривалість профілактичного курсу визначається індивідуально і може досягати 6 місяців.

При застосуванні препарату для лікування та профілактики імунодефіцитних станів – приймають по 1 таблетці на добу.

**Діти.**

Не застосовувати дітям.

**Передозування.**

Випадків передозування не зареєстровано. При випадковому передозуванні можливі диспептичні прояви, спричинені компонентами, що входять до складу препарату.

**Побічні реакції.**

Можливі алергічні реакції, включаючи свербіж, висип, крапив'янку, інремію шкіри та набряк, утруднення ковтання.

**Термін придатності.**

3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 20 таблеток у блістері з пілівки полівінілхлоридної та фольги алюмінієвої.

По 1 блістера разом з інструкцією для медичного застосування у картонній коробці.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Виробник.**

ТОВ "НВФ "МАТЕРІА МЕДИКА ХОЛДИНГ".

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

**Юридична адреса:**

Російська Федерація, 127473, м. Москва, 3-й Самотечний пров., буд. 9;

**виробничі дільниці:**

Російська Федерація, 454139, м. Челябінськ, вул. Бугурусланська, буд. 54.

**Заявник.**

ТОВ "Матерія Медика-Україна".

**Місцезнаходження заявника.**

Україна, 03062, м. Київ, вул. Невська, буд. 20,

тел.: +380 (44) 400-90-78.