

ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

РЕВАЛІД (REVALID)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 капсула містить суміш готових компонентів 451 мг, у тому числі: DL-метіоніну 100 мг, L-цистину 50 мг, кальцію пантотенату 50 мг, тіаміну гідрохлориду 1,5 мг, піридоксину гідрохлориду 10 мг, кислоти пара-амінобензойної 20 мг, екстракту проса 50 мг, екстракту зародків пшениці 50 мг, дріжджів медичних 50 мг, комплексу мікроелементів 65 мг (у тому числі заліза 2 мг, цинку 2 мг, міді 0,5 мг);

допоміжні речовини: кремнію діоксид колоїдний безводний, желатин, хіноліновий жовтий (Е 104), індигокармін (Е 132).

Лікарська форма. Капсули.

Капсули з корпусом прозорого світло-зеленого кольору та кришечкою прозорого темно-зеленого кольору. Вміст капсули – неоднорідний порошок жовтувато-коричневого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

АТ Фармацевтичний завод ТЕВА.

Н-4042 Дебрецен, вул. Паллагі 13, Угорщина.

Фармакотерапевтична група. Інші дерматологічні засоби. Код АТС D11A.

Препарат може замінити денну норму вітамінів, мікро- та макроелементів, оскільки він містить речовини, необхідні для нормального росту, розвитку та відновлення волосся і нігтів. Ревалід забезпечує організм речовинами, необхідними для побудови волосяних фолікулів, зміцнення нижніх шарів шкіри, підтримання гарного вигляду верхнього шару волосся.

Препарат добре впливає на структуру волосся, усуває себорею, лупу та свербіж. Хелатоформуючі мікроелементи, що містяться у препараті, мають високий рівень абсорбції. Екстракт проса (*Extractum Milii flavi*) містить велику кількість біологічно активного кремнію, який відіграє суттєву роль у біосинтезі кератину та сполучної тканини. Окрім вмісту різних вітамінів групи В, медичних дріжджів (*Faex medicinalis*), препарат багатий на біокатализатори, необхідні для росту клітин. Екстракт паростків пшениці (*Extractum Tritici germinis*) містить істотну кількість стеролу, лецитину, вітамінів А, D і Е, а також лінолеву кислоту.

Активні інгредієнти швидко всмоктуються з травного тракту і розподіляються в організмі. Різні вітаміни транспортуються у плазмі крові у вільній формі або зв'язуються з різними білками.

Показання для застосування.

Припинення або уповільнення випадання волосся і розвитку облісіння різного походження:

- лікування облісіння, що виникає у результаті захворювання або медикаментозного лікування; у період вагітності (за винятком І триместру вагітності); через виснаженість чи фізичні розлади; через нестачу вітамінів та мікроелементів, які надходять з їжею;
- для лікування розладів росту волосся, а також для поліпшення структури волосся у разі їх ламкості і тьмяності.
- лікування порушень росту та структури нігтів неінфекційної природи.

Протипоказання.

Індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів препарату. Підвищена чутливість до сої або арахісу. Порушення метаболізму кальцію (гіперкальціємія, гіперкальціурія). Ниркова недостатність. Гіпервітаміноз D. Одночасний прийом ретиноїдів або вітаміну D. Гіперурикемія. Порушення метаболізму заліза та міді в організмі. Саркоїдоз в анамнезі. Активна форма туберкульозу легенів. Декомпенсована серцева недостатність. Активна пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки (у зв'язку з можливим підвищенням шлункового соку). Випадання волосся внаслідок ендокринних порушень. Інфекційні захворювання нігтів. Тяжкі захворювання печінки. Уролітіаз, фосфатний літіаз. Підвищена кислотність.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Слід приймати до уваги вміст вітамінів і мінеральних речовин у препараті Ревалід при одночасному застосуванні інших вітамінів і мінералів. Якщо захворювання волосся або нігтів сильно прогресує, слід обов'язково звернутися до лікаря, оскільки ці ознаки можуть вказувати на наявність будь-яких захворювань.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Контрольованих досліджень у період вагітності або годування груддю не проводилось. Препарат не рекомендується застосовувати у I триместрі вагітності. При застосуванні препарату в період вагітності слід враховувати одночасне застосування інших (наприклад полівітамінних) препаратів.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Діти.

Не застосовувати дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Для дорослих і дітей віком від 12 років – по 1 капсулі 3 рази на день. Курс лікування зазвичай триває 2-3 місяці. Здебільшого випадання волосся нефізіологічного характеру припиняється вже після 1-го місяця лікування, а протягом 2-го чи 3-го місяця застосування препарату спостерігаються значні зміни у структурі волосся.

Якщо необхідно, курс лікування можна продовжити або повторити.

У тяжких випадках рекомендовано по 2 капсули 3 рази на день протягом 1-го місяця, після чого застосовувати звичайний курс лікування – по 1 капсулі 3 рази на день.

Капсули приймати з достатньою кількістю рідини після або безпосередньо під час їди.

Передозування.

Випадки передозування невідомі. Довготривале застосування великих кількостей може підвищити ризик розвитку побічних ефектів.

Побічні ефекти.

Можуть спостерігатися такі побічні ефекти як підвищення секреції шлункового соку, діарея, запор.

При застосуванні 6 капсул на день можливі незначні розлади травлення або зрідка головний біль та дратівливість. У таких випадках потрібно зменшити дозування до 1 капсули на день.

В осіб з підвищеною чутливістю до компонентів препарату, можливі алергічні реакції, шкірний висип, відчуття свербіж, кропив'янка; диспепсичні явища (шлунковий дискомфорт, біль в епігастральній ділянці), нудота, блювання.

При тривалому неконтрольованому застосуванні у великих дозах виникають гіперкальціємія, гіперкальціурія, гіперурикемія, транзиторні підвищення активності АСТ, лактатдегідрогенази, порушення функції нирок.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Лікування препаратом слід припинити у разі необхідності застосування сульфаніламідів, оскільки параамінобензойна кислота, що є складовою препарату, впливає на ефективність застосування сульфаніламідів. Ревалід знижує або обмежує ефективність лікарських засобів, що містять леводопу.

Термін придатності. 1,5 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 капсул у блістері, по 3 блістери в упаковці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Представник в Україні, Азербайджані, Грузії, Вірменії й Молдові - ТОВ "Тева Україна", тел. +38 044 240 17 67, www.teva.ua.