

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ВЕНІТАН®

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 г гелю містить β-есцину 10 мг;

допоміжні речовини: метилпарагідроксibenзоат (Е 218), натрію гідроксид, карбомери, пропіленгліколь, полоксамер, вода очищена.

Лікарська форма. Гель.

Безбарвний або злегка опалесцюючий прозорий гомогеннийгель з характерним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

Салютас Фарма ГмбХSalutas Pharma GmbH.

Ланге Герен 3, гемах ден лагепланен № 1-5, 39171 Сюзеталь, район Остервединген, Саксонія-Ангальт, НімеччинаLange Gohren 3, gemass den Lageplanen Nr. 1-5, 39171 Sulzetal, OT Osterweddingen, Saxony-Anhalt, Germany.

Фармакотерапевтична група.

Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Код АТС C05C X03.

Венітан®гель містить β-есцин. Есцин – це природна суміш тритерпенових сапонінів,отриманих з насіння кінського каштана (*Aesculus hippocastanum L.*), які мають протинабрякові, венотонічні властивості і протизапальну активність. Крім того, есцин діє на початковій стадії запального процесу, яка пов’язана з підвищеною мембранною і капілярною проникністю і продукуванням ексудату у прилеглі тканини.

Есцин проявляє антисеротоніновий та антигістамінний ефект.

Есцин інгібує активність простагландин-синтетази. Цей фермент необхідний длътворення простагландинів, які відіграють важливу роль у механізмі запалення.

Есцин запобігає зниженню вмісту АТФ в ендотеліальних клітинах і підвищує активність фосфоліпази А₂ ферменту, що відповідає за вивільнення попередників медіаторів запалення.

Есцин знижує активність лізосомальних ферментів, які розщеплюють протеоглікани у стінках капілярів. Це збільшує резистентність капілярів, знижує їхню проникність, зменшуючи таким чином кількість ексудату та утворення набряків.

Венітан®гель призначений для полегшення таких явищ як набряк, відчуття тяжкості і втоми в ногах, спричинені веностазом нижніх кінцівок. Він є добрим доповненням до компресійної терапії (еластичний биндаж, еластичні панчохи, пов’язки). Крім того, гель зменшує набряк і прискорює резорбцію гематом від ударів і внаслідок інфузій чи ін’єкцій.

Венітан®гель виготовлений на особливій термочутливій основі і легко наноситься на шкіру та сприяє поступовому вивільненню активної речовини.

Показання для застосування.

Варикозне розширення вен, набряки ніг і больові відчуття, пов’язані з венозною недостатністю, посттравматичні гематоми і гематоми після ін’єкцій та інфузій.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату, ушкодження шкіри (наприклад, опіки, екзема, відкриті рани).

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не наносити гель на запалену шкіру, відкриті рани та слизові оболонки. Не втирати при нанесенні. При виникненні запалення шкіри, тромбофлебиту, сильного болю, раптового набряку однієї або обох ніг, серцевої або ниркової недостатності слід негайно звернутися до лікаря. При раптовій появі виражених симптомів венозної недостатності (набряк, зміна кольору шкіри, відчуття напруження та біль), особливо на одній кінцівці, слід виключити тромбоз вен нижніх кінцівок.

Застосування гелю при варикозному захворюванні вен не замінює інших профілактичних або лікувальних заходів (наприклад, носіння підтримуючих еластичних панчів, обливання холодною водою).

Запобігати потраплянню гелю в очі та на слизові оболонки.Старанно мити руки після кожного нанесення гелю.

Гель містить метилпарагідроксibenзоат (Е 218), який може спричинити алергічну реакцію (у тому числі відстрочену), а у виняткових випадках –бронхоспазм, та пропіленгліколь (Е 1520), здатний спричинити подразнення шкіри.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Через відсутність відповідних даних Венітан®гель не слід застосовувати у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Досвіду застосування препарату дітям недостатньо, тому не рекомендується застосовувати його пацієнтам цієї вікової категорії

Спосіб застосування та дози.

Гель наносити тонким шаром на ушкоджену ділянку шкіри та навколо неї 2-3 рази на добу.

Не втирати.

Тривалість лікування залежить від вираженості терапевтичного ефекту. Якщо після 14 днів терапії покращання не настає, слід звернутися до лікаря. Терапію можна продовжувати до 8 тижнів або до зменшення симптомів.

Передозування.

Немає повідомлень щодо передозування.

Побічні ефекти.

Можливі реакції гіперчутливості, включаючи дерматит, у тому числі алергічний, шкірні висипання, свербіж, еритему, відчуття печіння шкіри, бронхоспазм. У разі виникнення таких реакцій необхідно припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома. Не рекомендується застосовувати гель на одній ділянці шкіри разом з іншими засобами для місцевого застосування.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25°C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 г у тубі; по 1 тубі у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.