

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**ПРИСИПКА ДИТЯЧА**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* цинку оксид;  
100 г порошку містять: цинку оксиду 10 г;  
*допоміжні речовини:* тальк, крохмаль картопляний.

**Лікарська форма.** Порошок для зовнішнього застосування.

Порошок білого або майже білого кольору, м'який, жирний на дотик.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод».  
Україна, 91019, м Луганськ, вул. Кірова, 17.

**Фармакотерапевтична група.**

Дерматологічні засоби. Препарати з пом'якшуючою та захисною дією. Препарати цинку. Код АТС D02A B.

Адсорбуючий, підсушуючий, антисептичний, протизапальний засіб для зовнішнього застосування. Має високу гігроскопічність, адсорбує виділення потових і сальних залоз, ексудат, зменшує тертя шкірних складок, захищає шкіру від несприятливого зовнішнього впливу.

Цинку оксид спричиняє денатурацію білків і утворення альбумінатів, які пригнічують процес місцевого запалення з ослабленням болючих відчуттів, звужують кровеносні судини, ущільнюють клітинні мембрани. Препарат зменшує вираженість місцевих явищ запалення і подразнення.

Компоненти препарату не проникають крізь шкіру і не виявляють системної дії.

**Показання для застосування.** Попрілості.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Гострі гнійно-запальні захворювання шкіри, мокнучі ділянки ураженої шкіри.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Препарат не застосовують при інфікованих ушкодженнях і гнійничкових захворюваннях шкіри. Поліпшення стану настає після дворазового або триразового застосування препарату. Не застосовувати присипку на вологу шкіру. Не допускати потрапляння препарату в очі та на поверхню ран.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Застосовують.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.* Не впливає.

*Діти.* Застосовують дітям.

**Спосіб застосування та дози.**

Присипку дитячу наносять на суху ділянку попрілостей. Термін лікування залежить від перебігу захворювання.

**Передозування.** Не відзначалося.

**Побічні ефекти.**

В осіб з підвищеною чутливістю – алергічні реакції (свербіж, гіперемія, висип).

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.** Не встановлена.

**Термін придатності.** 5 років.

**Умови зберігання.**

Спеціальні умови зберігання не потрібні. Для захисту від дії вологи зберігати в оригінальному пакуванні. Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 50 г у банках.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.