

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**БОРОМЕНТОЛ**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 1 г мазі містить: кислоти борної – 0,05 г, ментолу – 0,005 г;

*допоміжна речовина:* парафін білий м'який.

**Лікарська форма.** Мазь.

Мазь білого або світло-жовтого кольору, з характерним запахом. За зовнішнім виглядом мазь повинна бути однорідною.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ТОВ «Тернофарм»

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

**Фармакотерапевтична група.** Засіб, що діє на чутливі нервові закінчення. Інші засоби для лікування захворювань порожнини носа.

Код АТС R01A X30.

Комбінований препарат для місцевого застосування. Чинить антисептичну і знеболювальну дію. При зовнішньому застосуванні бороментол практично не абсорбується у системний кровотік.

**Показання для застосування.**

Свербіж шкіри, невралгії, риніт.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату, тяжкі порушення функції нирок.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Препарат призначений лише для зовнішнього застосування. Уникати потрапляння препарату в очі; не застосовувати препарат на великі ділянки шкіри; не втирати у ніздрі.

**Особливі застереження.**

Не наносити на слизову оболонку носа.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Препарат протипоказаний у період вагітності. Під час годування груддю застосовувати за умови, коли очікувана користь для жінки перевищує потенційний ризик для дитини.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Препарат не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

**Діти.**

Протипоказаний дітям віком до 3 років. У цьому віці можлива рефлекторна зупинка дихання.

**Спосіб застосування та дози.**

Мазь наносити у невеликих кількостях на уражені ділянки шкіри, при риніті – на шкіру крил носа та легко втирати. Частота нанесення та тривалість застосування залежить від досягнутого ефекту та переносимості препарату.

**Передозування.**

Не описане.

**Побічні ефекти.**

Можливі алергічні реакції, включаючи почервоніння шкіри, свербіж, кропив'янку, висипання, набряк, контактний дерматит, розвиток анафілактичних реакцій, у тому числі шоку, десквамації епітелію. При нанесенні на великі ділянки шкіри можливі блювання, діарея, головний біль, сплутаність свідомості, ниркова недостатність.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не виявлена.

**Термін придатності.**

2 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 25 г у банках без пачок, в тубах у пачках або без пачок

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.