

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату

ВІКАЛІН
(VICALINUM)

Склад лікарського засобу:

1 таблетка містить вісмуту нітрату основного 350 мг, магнію карбонату основного 400 мг, натрію гідрокарбонату 200 мг, кори крушини в порошок 25 мг, кореневища айру в порошок 25 мг, рутину 5 мг, келіну 5 мг;

допоміжні речовини: крохмаль картопляний, тальк, кислота стеаринова.

Лікарська форма. Таблетки.

Таблетки світло-коричневого кольору з малопомітними краплями, з плоскою поверхнею, скошеними краями та рискою.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПАТ «Монфарм». Україна, 19100, Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Заводська, 8.

Фармакотерапевтична група. Засоби для лікування пептичної виразки та гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби.

Код АТС А 02В Х.

Препарат чинить комплексну дію. Вісмуту нітрат основний, натрію гідрокарбонат та магнію карбонат чинять антацидну та в'язучу дію, кора крушини (хоч і в малій дозі) сприяє послаблювальному ефекту, рутин зменшує проникність капілярів, а кореневище айру та келін забезпечують спазмолітичний ефект.

Показання для застосування.

У складі комплексної терапії функціональної диспепсії, гіперацидного гастриту, пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Виражені порушення функцій нирок.

Гастрит зі зниженою секреторною функцією шлунка.

Хронічні запальні процеси в кишечнику.

Хронічні запальні процеси в жовчному міхурі.

Шлунково-кишкові кровотечі.

Гострі пропасні стани.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Під час лікування слід дотримуватися дієти. Під час лікування не слід вживати алкоголь. При лікуванні препаратом необхідно контролювати функцію нирок і концентрацію вісмуту в крові та сечі. Кал при прийомі таблеток має темно-зелений або чорний колір. Препарат рекомендується приймати за 2 години до або після застосування інших лікарських засобів.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності та годування груддю препарат не застосовують.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Будь-які випробування по вивченню впливу Вікаліну на здатність керувати транспортними засобами та іншими механізмами не проводились.

Діти.

Досвіду застосування Вікаліну дітям немає.

Спосіб застосування та дози.

Дорослі приймають по 1-2 таблетки 3 рази на добу, після їди, запиваючи ½ склянки теплої води. Таблетки перед прийомом рекомендується подрібнювати.

Тривалість лікування визначає лікар залежно від характеру та тяжкості захворювання.

Передозування.

Проявляється нудотою, блюванням, розвитком метгемоглобінемії, набряком повік, ясен.

Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти.

З боку травного тракту: інколи спостерігається почастішання випорожнення, що припиняється при зменшенні дози; нудота, блювання. Кал під час застосування препарату набуває темно-зеленого або чорного кольору.

З боку центральної нервової системи: головний біль.

З боку системи крові та лімфатичної системи: гемоглобінемія.

Загальні розлади: набряк ясен та повік, пігментація на язиці.

Алергічні реакції: можливий розвиток алергічних реакцій.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Під час лікування Вікаліном не слід приймати препарати, що містять вісмут, для запобігання ризику зростання вісмуту в крові.

При застосуванні Вікаліну зменшується резорбтивна дія тетрациклінів, оскільки при взаємодії тетрациклінів з препаратами, що містять катіони магнію, утворюються комплекси, які погано всмоктуються.

Не слід одночасно застосовувати з алкалоїдами, глікозидами, ферментними препаратами та антибіотиками.

Препарат зменшує всмоктування похідних кумарину.

Можливе зменшення всмоктування інших лікарських засобів, які застосовують разом з Вікаліном. Тому проміжок часу між прийомами препаратів повинен становити не менше 2 годин.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 10 таблеток у стріпах або блістерах, № 20 (10x2) у стріпах або блістерах, № 100 (10x10) у стріпах або блістерах.

Категорія відпуску. Без рецепта.