

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

СЕДОФЛОР[□]
(SEDOFLOR)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: рідина червонувато-бурого кольору, з ароматним специфічним запахом. Під час зберігання можливо випадання осаду;

склад: 100 мл містять спиртову настойку (1:10) із рослинної сировини складу: плодів глоду 1 г, трави пустирнику 2 г, хмелю пресованого 2 г, зерна вівса 2,5 г, трави меліси лікарської 1,5 г, плодів коріандру 0,5 г, трави буркуну 0,5 г;

допоміжна речовина : спирт етиловий 40 % (об/об).

Лікарська форма Настойка.

Фармакотерапевтична група Снодійні та седативні засоби. Код АТС N05C M 50**.

Фармакологічні властивості. Фітосед[□] виявляє седативно-транквілізуючу та гіпотензивну дію, знімає відчуття страху.

Фармакокінетика. Терапевтичний ефект Фітоседу[□] пов'язаний з біологічно активними речовинами рослин, які входять до його складу. Седативний ефект мають: у траві пустирнику та плодах глоду - флавоноїди, у траві буркуну - флавоноїди, у плодах коріандру, траві меліси лікарської та хмелю - терпеноїди та флавоноїди. У плодах вівса сполуки, що відповідають за седативний ефект, не визначалися, але в літературі є відомості про седативний ефект плодів вівса. Названі біологічні активні речовини поглиблюють і прискорюють сон, знімають відчуття страху, поліпшують загальний стан організму. Максимальний терапевтичний ефект настає через 1 - 1,5 години. Тривалість дії становить 1–3 години.

Фітосед[□] добре всмоктується слизовою оболонкою шлунка.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Показання для застосування.

- Неврози різної етіології.
- Легка форма неврастенії, що супроводжується дратівливістю, тривогою, страхом, підвищеною втомою, розсіяністю.
- Порушення сну.
- У комплексній терапії невротичних і неврозоподібних станів
- Нейроциркуляторна дистонія за гіпертензивним і кардіальним типом.
- Астенічний синдром (форма гіперстенічна).

Спосіб застосування та дози Дорослим і дітям старше 12 років призначають від 20 крапель до 1 чайної ложки (5 мл) у невеликій кількості води, 3-4 рази на добу, перед їдою та 1 раз – перед сном. Курс лікування – від 10 до 30 днів.

У разі потреби курс лікування можна повторити після 10-15-денної перерви.

Побічна дія. При індивідуальній підвищеній чутливості до компонентів препарату можливі алергічні реакції.

Протипоказання Індивідуальна непереносимість компонентів препарату; жінки у періоди вагітності та годування груддю; діти до 12 років.

Передозування. При перевищенні рекомендованих доз можлива сонливість. Препарат відмінити.

Особливості застосування Препарат використовують тільки розведеним. Препарат не можна призначати водіям, пацієнтам, які працюють з механізмами та пристроями, що потребують підвищеної уваги та швидких психічних і рухових реакцій. Призначати з обережністю при зниженій зсілості крові.

Під час зберігання можливо випадання осаду, однак це не впливає на ефективність препарату. Перед застосуванням збовтувати.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами Препарат потенціює дію лікарських засобів, які пригнічують ЦНС.

Умови та термін зберігання Зберігати в недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Термін придатності - 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 100 мл настойки у флаконі, що вміщені в індивідуальну упаковку.

Виробник. АТ “Ефект”.

Адреса. Україна, 61010, м Харків, вул. Георгіївська, 10.