

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

АУРОКАРД
(AUROCARD )

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г розчину містить Arnica Ø 0,005 г, Aurum chloratum D4 0,1 г, Convallaria majalis D1 0,1 г, Crataegus Ø 0,4 г, Ignatia D4 0,1 г;
допоміжні речовини: сахароза, етанол 96 %, вода очищена.

Лікарська форма. Розчин оральний.

Темно-коричневого кольору рідина з запахом алкоголю, праним, землистим.

Назва і місцезнаходження виробника.

Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина.
Deutsche Homoeopathie -Union DHU -Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany .

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат .

Аурокард містить п'ять окремих інгредієнтів, які доповнюють один одного при лікуванні серцевої недостатності легкого ступеня тяжкості. Такі інгредієнти, як *Crataegus, Aurum chloratum* і *Arnica* ефективні при недостатньому кровопостачанні серця (коронарна недостатність), зумовленому атеросклерозом. Вони виявляють стимулювальний ефект при слабкості серцевого м'язу. Крім того, ці інгредієнти мають стійкий терапевтичний ефект при таких симптомах як прискорене серцебиття, слабкість, нерівномірний пульс . *Convallaria* успішно застосовується при серцевій слабкості і порушеннях ритму серця. *Ignatia* впливає насамперед на психо-емоційні розлади, які можуть проявлятися у формі соматичних (кардіальних) порушень.

Показання для застосування. У комплексному лікуванні серцевої недостатності легкого ступеня тяжкості.

Протипоказання. Препарат протипоказаний пацієнтам з відомою гіперчутливістю до рослин родини Asteraceae (складноцвітних) або до інших інгредієнтів препарату, а також при терапії серцевими глікозидами (наприклад, дигітоксин, дигоксин), при гіпокаліємії, при вираженій артеріальній гіпотензії і брадикардії.
Препарат містить 48 об. % спирту, тому його не можна приймати пацієнтам, які страждають на алкоголізм.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат містить серцеві глікозиди. Через підвищену чутливість до серцевих глікозидів застосування препарату пацієнтам, які страждають на порушення роботи печінки, або нирок, гіпотиреоз, кисневу недостатність (гіпоксія), міокардити, після серцевого нападу або порушення кислотно-лужної рівноваги та електролітного балансу (наприклад, гіперкаліємія), має проводитися під наглядом лікаря.

Примітка: чутливість до глікозидів у пацієнтів може відрізнятися.

З обережністю призначати препарат пацієнтам із порушенням серцевої провідності, а також пацієнтам, які отримують внутрішньовенно препарати кальцію. Таким хворим приймати препарат слід тільки під наглядом лікаря.

Необхідно звернутися до лікаря, якщо симптоми захворювання не поліпшуються, зберігаються протягом 6 тижнів або у випадку стійкого набряку ніг.

Препарат не призначений для лікування декомпенсованої серцевої недостатності.

Препарат містить 48 об. % спирту (цукор).

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення симптомів захворювання. У цьому випадку під контролем лікаря слід зменшити дозу і частоту застосування препарату і після зменшення небажаних симптомів, відновити прийом препарату відповідно до інструкції. У разі вираженого первинного погіршення, що супроводжується поганою переносимістю препарату, пацієнту слід припинити його застосування та звернутися до лікаря.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат протипоказаний у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.Водія технічних засобів та особам, які працюють зі складними механізмами, слід бути обережними з огляду на наявність у препараті етанолу.

Діти.Препарат не можна приймати дітям.

Спосіб застосування та дози. Дорослим приймати по 5 крапель розчину 1-3 рази на добу. Максимальна добова доза становить 15 крапель, тому що препарат містить серцеві глікозиди.

Розчин слід приймати за півгодини до або через півгодини після прийому їжі, тримаючи його якийсь час у роті перед ковтанням. При необхідності препарат можна розчинити у невеликій кількості води.

Тривалість лікування визначається перебігом захворювання та характером комплексної терапії.

Не рекомендується застосовувати препарат більше кількох тижнів, не проконсультувавшись з лікарем (див. також розділ «Належні заходи безпеки при застосуванні»).

Передозування. Застосування великої кількості препарату може призвести до інтоксикації серцевими глікозидами конвалії травневої. При передозуванні серцевими глікозидами конвалії травневої можуть розвинутися такі самі симптоми, що й при інтоксикації алкалоїдами наперстянки. До основних симптомів передозування належать порушення серцевого ритму, нудота і блювання, розлади зору, запаморочення, сплутаність свідомості та галюцинації.

При передозуванні діючою речовиною *Crataegus* можливе виникнення: сонливості, брадикардії, зниження артеріального тиску.

У разі передозування необхідно негайно звернутися до лікаря для проведення належного лікування при необхідності.

Послідовність терапевтичних заходів при передозуванні залежить від ступеня інтоксикації. При легкому ступені передозування достатньо припинити застосування препарату і бути під пильним доглядом лікаря.

Пацієнтам з порушеннями серцевого ритму, що загрожують здоров'ю, потрібний постійний контроль роботи серця (моніторинг) в умовах відповідного медичного закладу.

Терапія симптоматична.

Побічні ефекти. Застосування препарату Аурокард може викликати побічні реакції.

Препарати, що містять *Convallaria majalis* (конвалія) можуть викликати наступні побічні реакції:

з боку шлунково-кишкового тракту: нудота, блювання, розлади шлунково-кишкового тракту та діарея.

з боку кардіоваскулярної системи: нерегулярний пульс та порушення серцевого ритму.

з боку органів чуття: затуманення зору (наприклад, зміни сприйняття кольорів у жовтій/зеленій ділянках).

Atiscae (арніка) може викликати наступні побічні реакції: реакції гіперчутливості, подразнення слизової оболонки кишково-шлункового тракту, відчуття серцебиття, збільшення та зменшення частоти пульсу, м'язовий параліч, порушення дихання.

Crategus (зілід) може викликати наступні побічні реакції: сонливість, значне уповільнення серцевого ритму, можливі алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри)

З моменту реєстрації препарату Аурокард даних про побічні реакції зареєстровано не було.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодійЕфективність і побічні дії препарату Аурокард посилюються при одночасному застосуванні хінідину, препаратів кальцію, сечогінних і проносних засобів, а також при тривалому лікуванні препаратами, які містять кортизон.

Препарат може посилювати дію снодійних, седативних, гіпотензивних засобів. Прийом із солями алкалоїдів не рекомендується у зв'язку з можливістю утворення негативних комплексів.

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 30 мл розчину у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.