

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
АЛЬГОПІКС
(ALGOPIX)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 100 г рідини містять дьогтю ялівцевого 0,5 г, екстракту зелених мікродоростейспиртового (1:7) 3 г, кислоти саліцилової 1 г.
допоміжні речовини: гелева основа, натрію хлорид, есенція Альгопікс, вода очищена.

Лікарська форма. Рідина для зовнішнього застосування.

Густа рідина темно-зеленого - коричневого кольору, зі специфічним запахом дьогтю та різким смаком.

Назва і місцезнаходження виробника .

Медіка АТ, Болгарія.
бул. Кн. Ал. Дондуков №82
1504 Софія, Болгарія.

Фармакотерапевтична група.

Дерматологічні засоби. Код АТС Д 11А Х20**.

Показання для застосування.

Як допоміжний і профілактичний засіб при жирній і сухій себорей. У комплексному лікуванні себорейного дерматиту і висівкоподібноголишаю з ушкодженням волосистого покриву голови.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість (алергія) до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки.

Препарат не повинен застосовуватися у випадках порушення цілісності шкіри, слизових оболонок очей та порожнини рота. При потрапленні рідини в очі можуть спостерігатися сльозотеча, почервоніння кон'юктиви та печіння. При почервонінні шкіри після застосування препарату, появи свербіжув або відчуття печіння, необхідно припинити його застосування, оскільки, можливо, ці симптоми є проявом алергічної реакції.

Застосовувати уважно при бронхіальній астмі, оскільки містить саліцилову кислоту. Уникати впливу сонячного світла протягом 24 годин після застосування препарату.

Може привести до зміни кольору волосся у людей з білявим, освітленим або забарвленим волоссям (через вміст дьогтю).

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не рекомендується застосовувати препарат під час вагітності і годування груддю

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Препарат не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Діти.

Препарат не можна застосовувати в дитячому віці, оскільки відсутні дані про ефективність і безпеку його застосування у дітей.

Спосіб застосування та дози.

Застосовується для обробки волосистої частини голови. 15 - 30 г препарату (1-2 столові ложки) наносяться на заздалегідь зволене волосся і за допомогою втирання досягається повне покриття волосся і шкіри голови піною. Нанесена рідина залишається на 5 - 10 хв з метою кращого проникнення в шари шкірного покриву, після чого змивається великою кількістю води. Рекомендується триразове застосування препарату протягом 1-2 тижнів.

З метою уникнення рецидивів частота застосування після досягнення лікувального ефекту - 1-рази на тиждень. Частота застосування і тривалість лікування, залежать від виду захворювання і його тяжкості.

Передозування.

При правильному застосуванні передозування препарату неможливе. При випадковому поглинанні рідини може спостерігатися підвищене слиновиділення, нудота блювання. У подібних випадках необхідне рясне промивання порожнини рота і шлунка, а при необхідності застосування симптоматичних засобів. При випадковому або помилковому застосуванні препарату на великих ділянках тіла можлива поява системних ефектів: головний біль, запаморочення, шуму у вухах.

Побічні ефекти.

Небажані реакції, пов'язані з застосуванням, поодинокі. Іноді на місці застосування можуть спостерігатися алергічні реакції у вигляді почервоніння, свербіжув та печіння. Тривале застосування препарату може привести до надмірного висушування шкіри.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Може застосовуватися одночасно з іншими лікарськими засобами для місцевого застосування (вкл. кортикостероїдами). Він не повинен застосовуватися одночасно з косметичними препаратами, які сильно висушують шкіру, і під час ультрафіолетового опромінення.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати захищеному від світла місці при температурі не вище 25°C.

Після розкриття флакону термін зберігання до 30 днів.

Упаковка.

По 200 г у флаконах №1, у картонній коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.