

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

РЕКУТАН

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: квіток ромашки (Flores Chamomilla) екстракт рідкий (1:1);
1 мл розчину містить квіток ромашки (Flores Chamomilla) екстракту рідкого (1:1) – 1 г;
допоміжні речовини: полісорбат, етанол 50 %.

Лікарська форма. Розчин.

Рідина темно-бурого кольору із запахом ромашки; допускається утворення осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС».

Україна, 61057, м. Харків, вул. Воробйова, 8.

Фармакотерапевтична група.

Дерматологічні препарати. Код АТС D11A X.

Рекутан має низку ефектів, обумовлених хімічними речовинами, що входять до складу екстракту квіток ромашки, зокрема протизапальний (пригнічує ексудативні процеси), ранозагоювальний (стимулює регенерацію тканин), а також чинить певну антисептичну дію. Рекутан не чинить місцевопозрадної дії. Тривале застосування препарату не спричиняє негативного впливу на організм.

Показання для застосування.

Як самостійний засіб або у комплексній терапії для лікування порожнини рота (стоматити, гінгівіти, глосити, пародонтоз), при захворюваннях ЛОР-органів (фарингіти, тонзиліти, у тому числі після тонзилектомії), у гастроентерології (хронічні гастрити, коліти та ентероколіти різного походження), у проктології (геморой); для профілактичної обробки піхви перед операцією кесаревого розтину.

Противказання.

Підвищена чутливість до препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не можна застосовувати нерозведений препарат.

При застосуванні препарату слід дотримуватись рекомендованих доз.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Рекутан у період вагітності не призначають.

У період годування груддю препарат застосовують тільки за призначенням лікаря.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

При застосуванні внутрішньо слід врахувати, що разова доза препарату містить 5 % етанолу.

Тому при застосуванні препарату внутрішньо пацієнту слід утриматися від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.

Діти.

Не застосовують.

Спосіб застосування та дози.

Рекутан застосовують місцево у вигляді полоскання, промивання, примочок (аплікацій), зрошень. Крім того, Рекутан приймають внутрішньо і вводять у пряму кишку.

При пародонтозі у дорослих – 1-2 чайні ложки (5 - 10 мл) Рекутану розводять в 1 склянці води (200 мл), після чого ним змочують турунди, які вводять у ясенні кишені на 10 - 15 хв щоденно або через день протягом 3 - 7 днів.

При стоматологічних захворюваннях призначають полоскання – 1 чайна ложка (5 мл) на ½ склянки теплої води (100 мл) декілька разів на добу протягом 2 - 3 днів залежно від перебігу захворювання.

При лікуванні захворювань верхніх дихальних шляхів разом з місцевим застосуванням препарату останній приймають внутрішньо у дорослих з розрахунку 1 чайна ложка (5 мл) на ½ склянки теплої води (100 мл) 1 - 2 рази на добу. Тривалість курсу лікування становить 3 - 4 тижні, повторні курси – 2 - 3 – з інтервалом у 2 - 3 місяці.

При виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки дорослим Рекутан призначають внутрішньо з розрахунку 1 чайна ложка (5 мл) на ½ склянки теплої води (100 мл) за 20 - 30 хв до вживання їжі 2 - 4 рази на добу. Тривалість лікування залежить від стану хворого і триває до покращання самопочуття. При колітах для посилення терапевтичного ефекту поряд з прийомом внутрішньо препарат доцільно застосовувати також у вигляді клізм. Для цього дорослим 1 - 2 чайні ложки (5 - 10 мл) Рекутану розводять в 1 склянці теплої води (200 мл) і вводять у пряму кишку після мимовільного випорожнення кишечника. Курс лікування становить 3 - 4 тижні. За необхідності лікування продовжують до 6 тижнів, а курси (2 - 3) повторюють з інтервалом в 1 - 2 місяці. Лікування рекомендується здійснювати на тлі відповідної дієти.

У проктології Рекутан призначають у вигляді клізм 2 - 3 рази на добу (бажано після мимовільного очищення кишечника). Для клізм дорослим Рекутан розводять з розрахунку 1 - 2 чайні ложки (5 - 10 мл) в 1 склянці теплої води (200 мл). При свербіжі в анальній і періанальній ділянках Рекутан застосовують у вигляді місцевих ванночок з дотриманням вказаного вище співвідношення препарату і води.

Для піхвового промивання – 2 - 3 столові ложки (30 - 45 мл) Рекутану розводять в 1 л теплої води. Призначають щоденно 2 - 3 рази на добу протягом 3 - 4 тижнів.

Передозування.

Даних про передозування препарату немає.

Побічні ефекти.

При індивідуальній підвищеній чутливості до ромашки можливе виникнення алергічних реакцій (гіперемія, висипання, свербіж шкіри, кропив'янка, набряк Квінке, анафілактичний шок).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія з лікарськими засобами поки що не відома.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці в добре закупореній тарі при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 100 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

без рецепта.