

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ФАСТИН

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г мазі містить анестезину (бензокаїну) 30 мг, фурациліну (нітрофуралу) 20 мг, синтоміцину 16 мг;
допоміжні речовини: поліетиленоксид-400, s ерінео P600, вода очищена.

Лікарська форма. Мазь.

Густа маса яскраво-жовтого кольору, без запаху.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПАТ «Лубнифарм».
Україна, 37500, м. Лубни, Полтавська обл., вул. Петровського, 16.

Фармакотерапевтична група.

Антибіотики та хіміотерапевтичні препарати для застосування у дерматології. Антибіотики у комбінації з хіміотерапевтичними засобами. Код АТС D06C.

Фастин, мазь, має бактеріостатичні властивості, поверхневий анестезуючий ефект.

У своєму складі мазь Фастин містить анестезину (бензокаїну) 30 мг. Бензокаїн малорозчинний у воді, що зумовлює його повільну абсорбцію. Як і усі ефірні похідні параамінобензойної кислоти, розщеплюється естеразою у плазмі крові та печінці. У результаті утворюються параамінобензойна кислота і етиловий спирт, що метаболізується до ацетилкоэнзимфарму А. Параамінобензойна кислота піддається кон'югації з гліцином або виводиться нирками у незмінному вигляді. Ступінь системної дії препарату після застосування на шкіру не вивчена.

Показання для застосування.

Місцеве лікування опіків I ступеня, свіжих опіків II-III ступеня, піодермії, гнійних ран.

Протипоказання.

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату. Алергічні та токсичні реакції (диспептичні явища, дисбактеріоз, психічні розлади) на хлорамфенікол в анамнезі, підвищена чутливість до похідних нітрофурану. Псоріаз, екзема, грибкові захворювання шкіри, алергічні дерматози.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат не застосовують пацієнтам, схильним до алергічних реакцій на синтоміцин, анестезин.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності або годування груддю препарат можна застосовувати лише тоді, коли, на думку лікаря, очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти.

Препарати, що містять у своєму складі синтоміцин для місцевого застосування, не призначають дітям у перші 4 тижні життя.

Дітям віком до 6 років препарат застосовують з обережністю тільки за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

Фастин, мазь застосовують дорослим і дітям шляхом аплікацій на шкіру. Мазь наносять тонким шаром на стерильну марлеву серветку, яку накладають на уражену поверхню шкіри. Пов'язку змінюють 1 раз у 7-10 днів. Частіші зміни пов'язки проводять при наявності болю, накопичуванні ексудату та в інших випадках, які можуть зменшити ефективність препарату і призвести до ускладнень патологічного процесу.

Передозування.

Можливе посилення проявів побічних реакцій. Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти.

З боку імунної системи: можливі алергічні реакції, пов'язані з підвищеною чутливістю до анестезину, синтоміцину (особливо при тривалому застосуванні), такі як гарячка, ангіоневротичний набряк, висипання.

З боку шкіри та її похідних: дерматити.

Можлива місцева подразнювальна дія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не встановлена.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 г у тубах алюмінієвих.

Категорія відпуску. Без рецепта.