

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
АКТОВЕГІН
(ACTOVEGIN®)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 100 г крему містять депротейнізованого гемодеривату з крові телят 5 мл, що відповідає 200 мг сухої маси;

допоміжні речовини: бензалконію хлорид, спирт цетиловий, гліцерол моностеарат, макрогол 400, макрогол 4000, вода очищена.

Лікарська форма. Крем.

Однорідний крем білого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

„Нікомед Австрія ГмбХ”, Австрія.

вул. Петер Штрассе 25, А-4021, Лінц, Австрія.

Фармакотерапевтична група. Засоби для лікування ран та виразкових ушкоджень.
Код АТС D03A X50.

Актовегін містить речовини з молекулярною масою менше 5000 дальтон. Препарат сприяє прискоренню процесів утилізації кисню (підвищує стійкість до гіпоксії) і глюкози, тим самим сприяє підвищенню енергетичного метаболізму. Сумарний ефект цих процесів полягає в посиленні енергетичного стану клітини, особливо в умовах гіпоксії та ішемії.

Фармакокінетика не вивчена, оскільки препарат містить компоненти, які зазвичай наявні в організмі.

Показання для застосування.

- Рани та запалення шкіри і слизових оболонок, такі як опіки, у тому числі сонячні, порізи шкіри, садна/подряпини.
- Для регенерації тканини після опіків, у тому числі після опіку окропом або паром.
- Виразки варикозного походження або інші мокнучі виразки.
- Профілактика та лікування пролежнів.
- Профілактика та лікування реакцій шкіри та слизових оболонок, зумовлених впливом радіації.

Протипоказання. Гіперчутливість до компонентів препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Застосування препарату Актовегін крем 5% допускається.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Немає даних щодо застосування препарату дітям.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують зовнішньо.

Виразки, рани, опіки I - II ступеня: після первинної терапії Актовегіном 20% у формі гелю протягом перших 5 днів наносять Актовегін 5% крем тонким шаром.

Курс лікування становить не менше 12 днів і триває протягом періоду регенерації.

Для профілактики пролежнів крем втирають у шкіру в зонах підвищеного ризику.

З метою профілактики виникнення радіаційних виразок Актовегін 5% крем наносять тонким шаром безпосередньо після радіаційної терапії і в інтервалах між сеансами.

Передозування. На сьогодні про випадки передозування препаратом не відомо.

Побічні ефекти. Завичай Актовегін 5% крем переноситься добре.

У поодиноких випадках у пацієнтів можуть виникнути місцеві реакції гіперчутливості (свербіж, печіння).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не встановлена.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.

Упаковка. Туби по 20 г; по 1 тубі у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.