

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
АКТОВЕГІН
(ACTOVEGIN®)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 100 г мазі містять депротейнізований гемодериват із крові телят 5 мл, що відповідає 200 мг сухої маси;

допоміжні речовини: пропілпарагідроксибензоат (Е 218), метилпарагідроксибензоат (Е 216), холестерин, спирт цетиловий, парафін білий, вода очищена.

Лікарська форма. Мазь.

Однорідна мазь білого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

„Нікомед Австрія ГмбХ”, Австрія.

вул. Петер Штрассе 25, А-4021, Лінц, Австрія.

Фармакотерапевтична група. Засоби для лікування ран та виразок.

Код АТС D03A X50.

Актовегін містить тільки фізіологічні речовини з молекулярною масою менше 5000 дальтон. На молекулярному рівні цей препарат сприяє прискоренню процесів утилізації кисню (підвищує стійкість до гіпоксії) і глюкози, тим самим сприяє підвищенню енергетичного метаболізму. Сумарний ефект цих процесів полягає в посиленні енергетичного стану клітини, особливо в умовах гіпоксії та ішемії.

Препарат прискорює загоєння ран та їх епітелізацію, активує саногенні та репаративні процеси у пошкоджених тканинах (покращує трофіку).

Дія зовнішніх лікарських форм Актовегіну не виходить за межі їх аплікації. Це було доведено шляхом повторних аплікацій у одних і тих самих осіб.

Показання для застосування.

- Рани та запалення шкіри і слизових оболонок, такі як опіки, у тому числі сонячні, порізи шкіри, садна/подряпини.
- Для регенерації тканини після опіків, у тому числі після опіку окропом або паром.
- Виразки варикозного походження або інші мокнучі виразки.
- Профілактика та лікування пролежнів.
- Профілактика та лікування реакцій шкіри та слизових оболонок, зумовлених впливом радіації.

Протипоказання. Гіперчутливість до компонентів препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Застосування препарату Актовегін 5 % мазь допускається.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Немає даних щодо застосування препарату дітям.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують місцево.

Призначають для тривалого лікування ран та виразок (прискорюється епітелізація) після терапії Актовегіном 20% гелем і 5% кремом препарат Актовегін 5% мазь наноситься тонким шаром 3 – 4 рази; для профілактики та терапії пролежнів – у вигляді пов'язок 3 – 4 рази на добу, курс лікування – 3 - 60 діб; для профілактики і лікування променевиx уражень препарат наносять тонким шаром на шкіру 2 - 3 рази на добу.

Передозування. На сьогодні про випадки передозування не відомо.

Побічні ефекти. Завичай Актовегін 5% мазь переноситься добре.

У поодиноких випадках у пацієнтів можуть виникнути місцеві реакції гіперчутливості (свербіж, печіння).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не встановлена.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.

Упаковка. Туби по 20 г; по 1 тубі у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.