

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЛЕПЕХИ КОРЕНЕВИЩА
(CALAMI RHIZOMATA)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: лепехи кореневища.

Лікарська форма. Кореневища.

Шматочки кореневищ різної форми жовтуватого або блідо-рожевого, іноді зеленуватого кольору з жовтувато-бурими, червонувато-бурими або бурими включеннями.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що підвищують апетит. Код АТС А15.

Біологічно активні речовини препарату, впливаючи на закінчення смакових рецепторів, підвищують апетит, покращують травлення, посилюють рефлекторне виділення шлункового соку, посилюють жовчовидільну функцію печінки, підвищують тонус жовчного міхура, збільшують діурез; виявляють тонізуючу, протизапальну, відхаркувальну, жовчоїнну, спазмолітичну, антибактеріальну і дезінфікуючу дію.

Показання для застосування.

Неспецифічні розлади функції травного тракту (відсутність апетиту, розлади травлення і секреторної функції шлунка, ахілія, кишкові коліки, метеоризм) – у складі комплексної терапії. Запальні захворювання порожнини рота і горла.

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Підвищена кислотність шлункового соку.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказане.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не встановлена.

Діти. Препарат застосовують дітям старше 7 років.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку кореневищ помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хв. Охолоджувати при кімнатній температурі 10 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років – по 1/4 склянки, дітям віком 12-14 років – по 2 столові ложки, 7-12 років – по 1 столовій ложці.

Перед прийомом відвар збовтати.

Приготовлений відвар у розведеному вигляді (водою у 2-3 рази) застосовувати для полоскання порожнини рота і горла.

3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15-20 хв. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років – по 1/2 склянки, дітям віком 12-14 років – по 1/4 склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки.

Приготовлений настій застосовують для полоскання порожнини рота і горла.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні ефекти.

Алергічні реакції (у т.ч. кропив'янка, висипання на шкірі, свербіж, набряки).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Знижує ефективність антацидів, блокаторів H₂-рецепторів (ранітидину, фамотидину).

Термін придатності. 3 роки при фасуванні у пачки, 2 роки – у фільтр-пакети.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Приготовлену водну витяжку – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.

По 30 г або 75 г або 100 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
АИРА КОРНЕВИЩА
(CALAMI RHIZOMATA)

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: айра корневища.

Лекарственная форма. Корневища.

Кусочки корневищ различной формы желтоватого или бледно-розового, иногда зеленоватого цвета с желтовато-бурыми, красновато-бурыми или бурыми включениями.

Название и местонахождение производителя.

ЧАО «Лектравы».

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир шоссе Киевское, дом 21.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, повышающие аппетит. Код АТС А15.

Биологически активные вещества препарата, воздействуя на окончания вкусовых рецепторов, повышают аппетит, улучшают пищеварение, усиливают рефлекторное выделение желудочного сока, усиливают желчевыделительную функцию печени, повышают тонус желчного пузыря, увеличивают диурез; оказывают тонизирующее, противовоспалительное, отхаркивающее, желчегонное, спазмолитическое, антибактериальное и дезинфицирующее действие.

Показания к применению.

Неспецифические нарушения функции пищеварительного тракта (отсутствие аппетита, нарушение пищеварения и секреторной функции желудка, ахилия, кишечные колики, метеоризм) – в составе комплексной терапии. Воспалительных заболеваниях полости рта и горла.

Противопоказания.

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Повышенная кислотность желудочного сока.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не установлена.

Дети. Препарат применяют детям старше 7 лет.

Способ применения и дозы.

1 столовую ложку корневищ поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 30 мин. Охлаждать при комнатной температуре 10 мин, процедить, остаток отжать в процеженный отвар. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 3-4 раза в сутки за 30 минут до еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1/4 стакана, детям 12-14 лет – по 2 столовые ложки, 7-12 лет – по 1 столовой ложке. Перед применением отвар взболтать.

Приготовленный отвар в разведенном виде (водой в 2-3 раза) применять для полоскания полости рта и горла.

3 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15-20 мин. Принимать в теплом виде 3-4 раза в сутки за 30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1/2 стакана, детям 12-14 лет – по 1/4 стакана, 7-12 лет – по 2 столовые ложки.

Приготовленный настой применять для полоскания полости рта и горла.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка. Сообщения отсутствуют.

Побочные эффекты.

Аллергические реакции (в т.ч. крапивница, высыпания на коже, зуд, отеки).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Снижает эффективность антацидов, блокаторов H₂-рецепторов (ранитидина, фамотидина).

Срок годности. 3 года - в пачках, 2 года - в фильтр-пакеты.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Приготовленное водное извлечение – при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка.

По 30 г или 75 г или 100 г в пачках с внутренним пакетом, по 1,5 г в фильтр-пакетах в упаковке № 20.

Категория отпуска. Без рецепта.