

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**ПРИСИПКА ДИТЯЧА**  
**(ASPERSIO PUERILIS)**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* цинку оксид;

1 г присипки містить цинку оксиду 0,1 г;

*допоміжні речовини:* тальк, крохмаль картопляний.

**Лікарська форма.** Порошок.

Білого або майже білого кольору, м'який, жирний на дотик порошок.

**Назва та місцезнаходження виробника.**

ПАТ «Вітаміни». Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31.

**Фармакотерапевтична група.** Дерматологічні засоби. Препарати з пом'якшувальною та захисною дією. Препарати цинку. Код АТС D02A B.

Адсорбуючий, підсушувальний, антисептичний, протизапальний засіб для зовнішнього застосування. Має високу гігроскопічність, адсорбує виділення потових і сальних залоз, ексудат, зменшує тертя шкірних складок, захищає шкіру від несприятливого зовнішнього впливу.

Цинку оксид спричиняє денатурацію білків і утворення альбумінатів, які пригнічують процес місцевого запалення з ослабленням болючих відчуттів, звужують кровеносні судини, ущільнюють клітинні мембрани. Препарат зменшує вираженість місцевих явищ запалення і подразнення.

Компоненти препарату не проникають крізь шкіру і не виявляють системної дії.

**Показання для застосування.** Попрілості.

**Протипоказання**

Гіперчутливість до компонентів препарату, гострі гнійно-запальні захворювання шкіри, мокнучі ділянки шкіри.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Препарат не застосовують при інфікованих ушкодженнях і гнійничкових захворюваннях шкіри. Не слід наносити препарат на вологу шкіру.

Поліпшення стану настає після дворазового або триразового застосування препарату. Не слід допускати потрапляння препарату в очі, дихальні шляхи і на відкриту поверхню рани.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Застосовують.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.* Не впливає.

*Діти.* Застосовують дітям.

**Спосіб застосування та дози.**

Препарат застосовують зовнішньо. Присипку наносять на суху ділянку попрілостей після купання та при замінах пелюшок. Термін лікування залежить від перебігу захворювання, його визначає лікар індивідуально.

**Передозування.** Не відзначалося.

**Побічні ефекти.**

При підвищеній чутливості до препарату можливі алергічні реакції (свербіж, гіперемія, висипання).

**Термін придатності.** 5 років.

**Умови зберігання.**

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 50 г у контейнері полімерному.

По 50 г у банці, по 1 банці у пацці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.