

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ІХТІОЛ

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 супозиторій містить іхтіолу 200 мг;

допоміжна речовина: жир твердий.

Лікарська форма. Супозиторії ректальні.

Супозиторії темно-бурого кольору із запахом іхтіолу. Допускається поява ледь помітного білого нальоту на поверхні супозиторію.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПАТ «Монфарм». Україна, 19100, Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Заводська, 8.

Фармакотерапевтична група. Антигемороїдальні засоби для місцевого застосування.

Код АТС C05A X.

Іхтіол містить приблизно 10,5 % сірки у вигляді органічних сполук, чим зумовлені його антисептичні, протизапальні та знеболювальні властивості. Протизапальна дія пов'язана з пригніченням вивільнення медіаторів запалення. При ректальному застосуванні препарат спричиняє подразнювальну дію на слизову оболонку прямої кишки, через що рефлекторно підсилюється кровообіг в органах малого таза, що сприяє усуненню запалення у передміхуровій залозі у чоловіків; у яєчниках, маткових трубах, матці – у жінок.

При ректальному введенні добре всмоктується у прямій кишці. Виводиться з калом.

Показання для застосування. У комплексному лікуванні запальних захворювань малого тазу (метрит, параметрит, сальпінгіт, аднексит, оофорит), хронічного неспецифічного простатиту та геморою.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Препарат можна застосовувати у випадках, коли очікувана користь для матері переважає потенційний ризик для плода (дитини).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Дані відсутні.

Діти. Не застосовувати дітям.

Спосіб застосування та дози. Призначати дорослим. Вводити ректально по 1 супозиторію 1-2 рази на добу після очищувальної клізми або після звичайного акту дефекації. Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально. Зазвичай курс лікування становить 7-14 днів. При рецидиві захворювання курс лікування повторити.

Передозування. Не описане.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції, включаючи свербіж, шкірні висипання, набряк, почервоніння у місці введення препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Взаємодія препарату у вигляді супозиторіїв з іншими лікарськими засобами не описана.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.

В оригінальній упаковці при температурі не вище 16°C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 5 супозиторіїв у стрипі. По 2 стрипи у пачці з картону.

Категорія відпуску. Без рецепта.