

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ПОЛИНУ НАСТОЙКА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: настойка трави полину (*Absinthii herba*) (1:5);

1 флакон містить настойки трави полину (*Absinthii herba*)(1:5)(екстрагент – етанол 70 %) – 25 мл.

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина бурувато-зеленого кольору, характерного запаху гірким смаком. Суміш препарату з водою (2:1) дає мутний розчин.

Допускається утворення осаду при зберіганні.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Біола».

Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що підвищують апетит. Код АТС А15.

Полину настойка містить гіркоти. Механізм дії препарату обумовлений подразненням чутливих нервових закінчень – смакових рецепторів слизових оболонок порожнини рота, язика, що рефлекторним шляхом спричиняє посилення секреції шлункового соку, підвищення апетиту, покращання процесу травлення.

Показання для застосування.

Гіпоацидні та анацидні гастрити, анорексія – у складі комплексної терапії.

Противпоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Підвищена шлункова секреція, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, рефлюкс-езофагіт, жовчокам'яна хвороба, епілепсія. Наявність в анамнезі кровотеч із органів малого таза; анемія.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не слід застосовувати у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Оскільки до складу препарату входить етанол, він може впливати на здатність керувати автотранспортними засобами або працювати з потенційно небезпечними механізмами, тому на період лікування препаратом слід утриматися від роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Діти.

Не слід застосовувати дітям до 12 років. Дітям від 12 років препарат застосовують за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

Полину настойку дорослим та дітям від 12 років приймати по 15-20 крапель 3 рази на добу за 15-30 хвилин до їди. Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально та залежить від тяжкості захворювання, характеру супутньої терапії, досягнутого ефекту.

Передозування.

Застосування у підвищених дозах, особливо тривале, може призвести до отруєння – розитку судом, галюцинацій, втрати свідомості.

При тривалому застосуванні можливі атонічні запори.

Лікування. Симптоматичне.

Побічні ефекти.

Тривале застосування Полину настойки може спричинити так звану полинну епілепсію.

Нудота, блювання, можливі реакції підвищеної чутливості (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж). При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не виявлена.

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла місці. Зберігати у недоступному для дітей місці. При зберіганні допускається утворення осаду.

Упаковка.

По 25 мл у флаконах. По 1 флакону у пачці або без пачки.

Категорія відпуску. Без рецепта.