

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

РОДІОЛИ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ
(RHODIOLAE EXTRACTUM FLUIDUM)

Склад лікарського засобу:

1 флакон препарату містить:

діючі речовини: екстракт рідкий з кореневищ з коренями родіоли рожевої (*Rhodiola radix*) (1:1) (екстрагент – етанол 40 %) – 50 мл.

Лікарська форма. Екстракт рідкий.

Рідина темно-бурого кольору з характерним ароматом.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПАТ «Біолік», Україна,

24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Леніна, 118.

Назва і місцезнаходження заявника.

ТОВ «Українська фармацевтична компанія».

Україна, 02098, м. Київ, вул. Березняківська, 29.

Фармакотерапевтична група. Тонізуючі засоби. Код АТС А13А.

Екстракт родіоли рідкий належить до групи тонізуючих засобів, характеризується адаптогенними властивостями завдяки вмісту у кореневищах з коренями органічних кислот, дубильних речовин, бета-ситостерину, двох кристалічних речовин: n-оксифеніл β-етанолу n-тирозину і його глікозиду n-оксифеніл-β-(β-α глюкопіранозиду)-етанолу родіолізіду. Препарат підвищує стійкість організму до несприятливих факторів (переохолодження, перегрівання, кисневе голодування, різні стреси), послаблює психічне напруження, підвищує розумову і фізичну працездатність за рахунок оптимізації енергетичних процесів і стимуляції функцій центральної нервової системи. Отримано експериментальні дані про антиаритмічну дію екстракту родіоли рідкого.

Показання для застосування.

Астенічні стани, підвищена втомлюваність, неврастенія, вегетосудинна дистонія, період реконвалесценції, зниження працездатності.

Протипоказання.

Артеріальна гіпертензія, пропасниця, підвищена чутливість до компонентів препарату, вагітність, період годування груддю, вік до 18 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Родіоли екстракт рідкий не рекомендують приймати у другій половині дня для із серцево-судинними захворюваннями та цукровим діабетом.

попередження безсоння, з обережністю призначають препарат особам

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказане.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не виявлена.

Діти.

Не призначати дітям (віком до 18 років).

Спосіб застосування та дози.

Препарат застосовують дорослим внутрішньо по 5-10 крапель 2-3 рази на день за 10 хвилин до їди. При астенії, у психіатричній практиці призначають спочатку 10 крапель 2-3 рази на день, поступово підвищуючи дозу до 30-40 крапель на прийом. Тривалість лікування 1-2 місяці.

Передозування.

На сьогодні інформації про випадки передозування не надходило. Можлива надмірна збудливість, при якій рекомендується відмінити препарат.

Побічні ефекти.

Підвищена збудливість, безсоння, головний біль, підвищення артеріального тиску. Можливі випадки підвищеної чутливості до препарату, при яких необхідна десенсібілізуюча терапія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат може посилювати вплив інгібіторів МАО й інших психостимулювальних засобів.

Термін придатності.

5 років.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл, 50 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.