

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**СЕПТИЛ**  
**(SEPTIL)**

**Склад:**

*діюча речовина:* 100 мл розчину містять не менше 69,3 % об/об і не більше 70,7 % об/об етанолу (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O);  
*допоміжна речовина:* вода очищена.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.

**Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТХD08A X08.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.* При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцево - подразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів.

*Фармакокінетика.* При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.** Фурункули, панариції, інфільтрати, мастити на початкових стадіях. Для обтирання та компресів. Хірургічна обробка рук хірургів.

**Протипоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість. Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри.

**Особливі заходи безпеки.**

У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування препарату і змити рідину водою. Не допускати потрапляння препарату в очі!

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.

**Особливості застосування.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

Зовнішньо – для обтирання, компресів, дезінфекції шкіри, у тому числі рук. Для компресів, обтирань (з метою запобігання опіку) етанол слід розвести водою у співвідношенні 1:1.

**Діти.**

Застосовують за призначенням лікаря.

**Передозування.**

При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.

**Побічні реакції.**

При місцевому застосуванні можливі подразнення шкіри або слизових оболонок. У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

**Термін придатності.**

5 років.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати в добре укуповеній тарі та недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 100 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.** За рецептом.

**Виробник.**

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Україна, 10014, Житомирська обл., м. Житомир, Корольовський район, вул. Лермонтовська, будинок 5.

**ІНСТРУКЦІЯ**

**для медичного застосування лікарського засобу**

**СЕПТИЛ  
(SEPTIL)****Склад:**

*діюча речовина:* 100 мл розчину містять не менше 69,3 % об/об і не більше 70,7 % об/об етанолу (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O);

*допоміжна речовина:* вода очищена.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.

**Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТХD08A X08.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.* При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцево - подразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів.

*Фармакокінетика.* При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.** Фурункули, панариції, інфільтрати, мастити на початкових стадіях. Для обтирання та компресів. Хірургічна обробка рук хірургів.

**Противоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість. Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри.

**Особливі заходи безпеки.**

У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування препарату і змити рідину водою. Не допускати потрапляння препарату в очі!

***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.

***Особливості застосування.***

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

***Спосіб застосування та дози.***

Зовнішньо – для обтирання, компресів, дезінфекції шкіри, у тому числі рук. Для компресів, обтирань (з метою запобігання опіку) етанол слід розвести водою у співвідношенні 1:1.

***Діти.***

Застосовують за призначенням лікаря.

***Передозування.***

При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.

***Побічні реакції.***

При місцевому застосуванні можливі подразнення шкіри або слизових оболонок. У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

***Термін придатності.***

5 років.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

***Умови зберігання.***

Зберігати в добре укуповеній тарі та недоступному для дітей місці.

***Упаковка.***

По 100 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.** За рецептом.

***Виробник.***

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

***Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.***

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.