

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ВІЛЬХИ СУПЛІДДЯ
(ALNI FRUCTUS)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: вільхи супліддя.

Лікарська форма. Супліддя.

Цільна сировина: яйцеподібні або довгасті супліддя вільхи (шишки) з плодоніжками або без них, лусочки або плоди; колір суплідь і гілочок темно-бурий або темно-коричневий; запах слабкий; смак в'язучий.

Подрібнена сировина: шматочки плодоніжок, лусочок, осей суплідь різної форми і плоди-горішки, від світло-коричневого до темно-коричневого кольору; запах слабкий; смак в'язучий.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на травну систему та метаболічні процеси. Код АТС А16А Х.

Біологічно активні речовини суплідь виявляють в'язучу, дезінфікуючу, протизапальну, десенсибілізуючу і кровоспинну дію; сприяють зменшенню бродильних і гнильних процесів при хронічних захворюваннях травного тракту, а також епітелізації слизових оболонок.

Показання для застосування.

Гострі та хронічні ентерити ентероколіти коліти, диспепсії (у комплексному лікуванні).

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не встановлена.

Діти. Препарат застосовують дітям віком старше 5 років за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

Цільна сировина: 2 столові ложки помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком старше 14 років – по 1 столовій ложці; дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці, 5-10 років – по

1 чайній ложці. Перед застосуванням відвар збовтати.

Подрібнена сировина: 1 столову ложку подрібнених суплідь помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані

30 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років – по 1 столовій ложці; дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці,

5-10 років – по 1 чайній ложці. Перед застосуванням відвар збовтати.

Фільтр-пакети: 2 фільтр-пакетик помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настояти 15-20 хв. Приймати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та підліткам віком старше 14 років – по 1 столовій ложці; дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці, 5-10 років – по 1 чайній ложці.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування.

Передозування та тривале застосування викликає прояви гіперчутливості до препарату у вигляді алергічних реакцій.

Побічні ефекти.

Алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж та набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

В оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30°C. Приготовлену водну витяжку – при температурі 8-15°C не більше 2 дб.

Упаковка.

Цільна сировина по 40 г у пачках, подрібнена сировина по 100 г у пачках із внутрішнім пакетом, по 2,5 г у фільтр-пакетах у упаковці № 20.

Категорія відпуску. Без рецепта.